

jam monuit (Synops. pag. 426.). In planitie ad Araxem sita abundat.

719. *Podospermum heterophyllum* C. Koch; Radix multiceps, caulibus florigeris et capitibus sterilibus instructa; Caulis tomento brevi canus; Folia radicalia inferiora linearia, pinnis linearibus: superiora oblanceolato-linearibus pinnis inferioribus obovatis ovatisque, superioribus oblongis instructa; Folia caulina 1 — 3juga; Rami sulcati. Calathidia fructifera duplo majora quam in specie antecedente. Ibidem minus crebrius.

720. *Tragopogon pratensis* L. In Georgia et Armenia abundat.

721. *Tragopogon pratensis* L. *caucasicus*; Forma alpina, caule abbreviato, ramis elongatis saepe adscendentibus et foliis brevioribus ex basi aequalibus. In regionibus alpinis Caucasi. *T. brevirostris* DC. fortasse hic referendus.

722. *T. floccosus* W. et K. A priori simili differt floribus majoribus, achaeniis et rostris dense muricato-dentatis et foliis basi latioribus caulem amplectentibus. In Armenia.

723. *Scorzonera suberosa* C. Koch; Tuber oblongum squamis crassis suberosis obtectum, plures scapos 1 — 2 folios gerens, trunco carens; Folia linearia scapos superantia, margine subundulata; Phylla ovato-lanceolata, villosa aut tantum ciliata; Flores lilacini; *S. Szovitsii* DC. (*S. mollis* F. et M.) trunco longe producto differt. In Somchetia meridionali in terra lapidosa abundat.

724. *Lasiospora lanata* F. et M. In tractu Bortschalo.

725. *Picris hieracioides* L. In Cartalinia.

c. *Lactuceae*.

726. *Lactuca Scariola* L. Ad Tiflin.

727. *Lactuca caucasica* C. Koch; Glaberrima; Dentes foliorum saepe spinescentes; Rami elongati ex basi caulis prae-

sertim orti; Calathidia spicata; Achaenia in utroque latere septemstriata ex apice setulosa, rostro albo aequantia. *L. quercina* L. cui simillima, rostro atro differt. In Ossia et Cartalinia. Varietates duas observavi:

α. major (1 — 1½ ped. alt.). Folia inferiora lyrato-runcinata, dentibus subspinescentibus, superiora subintegra dentibus copiosis minoribus instructa.

β. minor (½ ped. alt.). Folia conformia, oblanceolata, margine cartilagineo-subdenticulato.

728. *Lactuca altissima* M. B. In Armenia boreali.

729. *Lactuca muralis* DC. In Ossia.

730. *Taraxacum officinale* Wigg. (Koch synops. Pag. 428.)

α. genuinum; Glabrum; Folia profunde runcinata; Lacinae ex basi latae; Phylla lineari-lanceolata; Achaenia testacea; Pappus fragillimus, sordide-flavescens. In Somchetia.

β. glaucescens M. B. Glabrum; Folia runcinato-pinnatifida; Lacinae lanceolatae, retrorsum curvatae; Phylla lanceolato-lineararia; Achaenia ex apice sola muriculata, testacea, rostro breviora; Pappus fragilis, sordidus. In Cartalinia.

γ. eriocaulon; Folia glabra; Lacinae ex basi latae, retrorsae; Scapus albo-lanuginosus; Phylla exteriora ovato-acuminata, interiora lanceolata; Achaenia praesertim ex apice setulosa; Pappus minus fragilis, sordidus. In montibus ilwensibus.

731. *Taraxacum serotinum* Poir. *β. eriocaulon*; Folia scabra; Lacinae angulato-dentatae, ex basi latae; Phylla lineari-lanceolata; Scapus albo-lanuginosus; Achaenia testacea, praesertim ex apice setulosa; Pappus minus fragilis, sordidus. In Ossia et Cartalinia.

732. *Taraxacum erythrospermum* Andr. Glabrum, glaucescens; Scapus junior sublanuginosus; Lacinae retrorsae, lanceolatae, Phylla exteriora breviora, ex basi latiora;