

5. *LES CHICORACÉES,*
ou SEMI-FLOSCULEUSES.

* *LACTUCA CHAINI.* Tab. IX. fig. 1.

Lactuca foliis levibus ; radicalibus lyratis ;
 caulinis erosis, sagittatis, posticè dentatis ;
 floribus spicatis.

SONCHUS nitidus.

Sonchus foliis dentato-sinuatis, aveniis ; squamis
 calicinis nitidis ; caule erecto.

Affinis est Sonchi arvensis LINN.

HEDYPNOIS.

Le calice représente un vrai cône renversé ;
 & ses écailles se prolongent sur le péduncule.
 L'aigrette des semences est sessile : le récep-
 tacle est nud.

HEDYPNOIS autumnalis.

Leontodon autumnale LINN. *Spec.* 1123.

HEDYPNOIS Pyrenaïca.

Leontodon Pyrenaicum. GOU. *Illustr. Bot.* 55.
 tab. XXII.

HEDYPNOIS Taraxaci. Tab. XXVI. fig. 3.

{ *Hieracium Taraxaci* LINN. 1125.

Hedypnois foliis ligulatis, integris & pinnatifidis
 longitudine scapi ; calice lanato ; radice præ-
 morsâ.

HYOSERIS Taraxacoides. Tab. XVIII. fig. 3.

Leontodon saxatile JUSS.

Hyoseris foliis sinuato-dentatis ; seminum centra-
 lium pappis plumosis ; pilis foliorum furcatis ;
 radice fibrosâ.