

la base, chargées sur les bords et sur la carène de petits aiguillons; fleurs en grappes formant une panicule pyramidale très ouverte; fruits d'un brun noir, marqués de 5 stries de chaque côté, entourés d'un bord saillant et glabres au sommet. Fleurs jaunâtres. Juin, septembre (2). Lieux incultes, haies, bois pierreux. C.

Obs. Les feuilles des *Lac. scariola* et *virosa* varient, quelquefois sur le même individu, entières ou pinnatifides.—On cultive et on trouve auprès des jardins les espèces suivantes : *L. capitata* DC. vulg. *L. pommée*, feuilles radicales arrondies concaves boursofflées à côte lisse, tige peu élevée paniculée. — *L. crispa* DC. (*L. frisée*), feuilles radicales planes ondulées crépues à côte hispide, les autres lisses, les supérieures très entières. — *L. sativa* L. (*L. romaine*, *Chicon*), feuilles dressées oblongues rétrécies à la base, à côte lisse, tige élancée, feuillée.

1164. L. saligna. L. sp. 1119. (*L. saulière*.) — Tige de 6 à 9 décimèt. dressée ou diffuse, simple ou rameuse, grêle, blanchâtre effilée; feuilles amplexicaules, auriculées, lisses ou un peu hispides sur la carène, les inférieures roncinées pinnatifides à lobes aigus, les supérieures linéaires acuminées allongées, très entières; fleurs d'un jaune pâle, courtement pédicellées le long des rameaux et formant une grappe lâche effilée. Juillet, septembre (2) Bords des champs, lieux pierreux et stériles des terrains calcaires. C.

Var. *b. cyanantha*. N. — A fleurs bleues. RR. — ALL. *Montord* près *Saint-Pourçain* (Causse). — NÈV. *Bord de l'Allier au port Barraut*.

1165. L. muralis. Fres. (*L. des murailles*.) *Prenanthes*. — L. sp. 1121. *Chondrilla* — Lam. — Tige de 5 à 9 décimèt. droite, lisse, rougeâtre, rameuse au sommet; feuilles glabres, lyrées, pinnatifides, à lobes profonds larges, ovales anguleux dentés, d'un vert foncé en dessus, pâles et un peu glauques en dessous, les radicales pétiolées, les caulinaires rétrécies en pétiole ailé et embrassant la tige par 2 oreillettes aiguës; panicule terminale lâche, à pédicelles grêles, rameux; aigrette portée par un court pédicelle. Fleurs jaunes, à involucre brun rougeâtre. Juin, septembre (2). Vieux murs, lieux couverts, bois. C.

1166. L. viminea. Link. En. Ber. 2. p. 281. (*L. osier*.) *Prenanthes*. — L. sp. 1120. *Chondrilla*. — Lam. *Phenopus vimineus*. DC. prod. pro parte. — Tige de 6 à 9 décimètres simple ou à rameaux blanchâtres, effilés, allongés, dressés; feuilles radicales, pinnatifides à lobes irrégulièrement ovales oblongs denticulés, celles de la tige profondément pinnatifides à lobes oblongs lancéolés pointus denticulés, les florales linéaires entières toutes glauques, longuement décurrentes de chaque côté, anthodes oblongs presque en grappe le long des rameaux, se fermant vers midi, demi-fleurons d'un jaune très pâle un peu violacé en dehors et dont la partie saillante hors de l'involucre n'égale que la moitié de celui-ci; fruit brun fusiforme comprimé sillonné de côtes chargées d'aspérités transversales et atténué en un bec filiforme presque aussi long que lui-même; aigrette molle très blanche. Juillet, août (2). Lieux pierreux, coteaux des terrains calcaires. RR. — S. et L. Desize, Sampigny, Mercurey, Saint-Sernin-du-Plain (Carion).

1167. L. chondrillaeflora. Bor. (*L. à fl. de chondrilla*.) *L. ramosissima*. Bor. not. sur q. q. pl. fr. n° XX. non All. — Tige de 3 à 6 décimètres à rameaux nombreux blanchâtres effilés dressés ou divergents; feuilles ra-

dicales roncées pinnatifides à lobes linéaires ou linéaires lancéolés aigus entiers ou un peu dentés, celles de la tige pinnatifides à lobes oblongs aigus, un peu arqués, les supérieures entières linéaires lancéolées aiguës, toutes glauques et décurrentes de chaque côté; anthodes oblongs souvent fasciculés et comme en grappe le long des rameaux, ne se fermant qu'au déclin du soleil, demi-fleurons d'un beau jaune sur les deux faces et dont la partie saillante hors de l'involucre est aussi longue que l'involucre lui-même; fruit d'un brun noir, fusiforme comprimé sillonné de côtes chargées d'aspérités transversales et deux fois aussi long que le bec qui le termine, aigrette molle très blanche. Août, septembre (2). Rochers chauds. RR. — S. et L. Cluny (Berthiot). — C. dans les débris volcaniques de la Haute-Loire près *Le Puy*. — Du Puy-de-Dôme près *Clermont*. — Se retrouve en M. et L. *rochers de Beaulieu*.

Obs. J'avais mal à propos rapporté cette espèce au *L. ramosissima* All. qui diffère par sa taille bien moins élevée, ses rameaux courts très divergents, comme épineux, la décurrence des feuilles moins marquée, les demi-fleurons d'un rouge foncé en dessous, etc.

331. CHONDRILLA. L. (Chondrille.) Involucre simple de 7 à 10 écailles droites linéaires, muni à la base de petites folioles accessoires en forme de calicule; réceptacle nu; 7 à 12 demi-fleurons disposés sur deux rangs; fruit muriqué au sommet et couronné par des dents, du centre desquelles sort un pédicelle grêle soutenant une aigrette à poils simples. — Plantes à suc laiteux et visqueux.

1168. C. juncea. L. sp. 1120. (C. effilée.) — Tige de 6 à 9 décimèt. droite, très rameuse, cylindrique pubescente à la base et hérissée de poils roides recourbés; rameaux lisses, effilés, allongés étalés, rameux, presque nus; feuilles radicales étalées en rosette, oblongues roncées pinnatifides à lobes dentés inégaux; les caulinaires entières, linéaires allongées, étroites; anthodes presque sessiles, solitaires ou ternés le long des rameaux; involucre légèrement farineux. Fleurs jaunes. Juin, septembre (2). Lieux secs, champs pierreux ou sablonneux. CC.

Obs. Les feuilles radicales qui ressemblent à celles du Pissenlit n'existent plus, ordinairement, au moment de la floraison.

1169. C. latifolia, Marschal. fl. cauc. 2. p. 244. (C. à larges feuilles) — Tige de 6 à 9 décimèt. droite, robuste, rameuse, pubescente et hérissée dans sa partie inférieure de poils roides piquants recourbés, sillonnée dans sa partie supérieure; rameaux dressés, feuillés, un peu hispides et parsemés, surtout dans leur jeunesse, d'une pubescence farineuse; feuilles radicales grandes, fermes, obovales oblongues roncées, à lobes peu profonds, les caulinaires sessiles, elliptiques lancéolées, bordées de petites dents sétacées; anthodes pubescents farineux, sessiles, axillaires, solitaires ou ternés, souvent hérissés de poils roides étalés. Fleurs jaunes. Juin, août (2). Lieux secs. RR. — *Je l'ai recueillie à Moulins sur le revers de la levée de l'Allier, à peu de distance du cours de Bercy.* — *Coteaux de la Limagne, bords de l'Allier.* — *Environs de Montbrison (Lecoq).*

332. TARAXACUM. Haller. (Pissenlit.) Involucre imbriqué à