

1771. add: *A. erinthoides* Kirschleg., stat. Als. et Voges. —  
1773. add: Sv. Bot. t. 425.  
1779. lin. 6. lege: aest. ord.  
1782. post „Petersberg“ posse: , —  
add: am Ufer der Raja bei Pentimiglia: *Aud Eulmann*.  
1786. post „Dalmatien“ add: am  
Nanar v. IP' el den.  
1788 b. *A. ragusina* L. tomentosa,  
foliis oblongis, inferioribus crenato-  
dentatis, caule ramoso, ramis me-  
nocephalis. Herm. lgdb. p. 673. ic.  
Mitt. t. 146. f. 1. Folia striata,  
acutiora, acutius dentata quam  
reliquorum. — Dalmatien und auf  
den Inseln des adriatischen Meeres.  
— Juli. Juli. 2.  
1791. add: haec referunt Leontod. cl-  
latum Scop. t. 31. — add: auf  
wassenen Wiesen der Berggaukne bei  
Bregenz: Sauter.  
1793. add: *Leont. taraxacoides* H. Pp.  
sp. Sturm 41. color ligularum. vi-  
deatur erroneous.  
1799. post diagnosis add: *Leontodon*  
*Taraxacum* Linn. Bull. t. 217.  
Sv. Bot. t. 4.  
1817. add: *L. coerulea* (Stöhr.)  
Saut. foliis runcinato - pretinatis-  
fidiis edentulis, superioribus hasta-  
to - linearibus, corymbia fastigiatissima;  
— observations alteriori digna vi-  
detur, nonnulli fragmata accepi,  
habitu capitaliisque Sonchus tatarico  
accidentem, viride, foliis ferre Phoe-  
nixropodis ramosissimam. — Tyrol,  
bei Zirl an einem fast unzugäng-  
lichen Felste: Andr. Sauter. —  
Juli. 2.  
1820. add: *Malgedium* Cass. anno  
tandem 1820. iterum appellatum ge-  
nus: *Agathyrsus* Don.  
1823. add: in Albanien in saligen  
Sämpfen: v. IP' el den.  
1825. add: bei Freiburg hinter dem Stadt-  
waldchen: Rössler.  
1824. lin. 7. pro 601. lege: 600. —  
dole: syn. *Scorzonera* *caerulea* IP'.  
1825. lin. 6. ante „et“ add: Sv. Bot.  
217. — lin. 5. ab infra post „et“  
add: obs. t. 100.  
1828 b. *Sc. intermedia* (Biss. b.)  
Roch. caule ramoso, foliis ampli-  
tissimis crato-lanceolatis acumi-  
natim undulatis integris glabris, an-  
thodio glabro. Roch. Bass. t. XXX.  
f. 62. Ab utraque vicina differt ru-  
dine lac flavum fundente, glabritis,  
et foliis integrissimis impressis a vera  
*Sc. hispanica*, undulatis porro a  
*Sc. glauca*. Flores sulphurei spe-

- ciosi, anthodii squamas latissimas.  
— Einzelns und selten an grasigen  
Waldplätzen und an den Hängern  
der IP' aldeuge in der vierten Region  
im Hunsar auf dem Berge Simon: —  
Rochel. — Mai. Juni. 2.  
1841. lin. 4. add: *Scop. caru.* t. 46.  
1842. add: *Scop.* t. 46.  
1850. add: *Bull.* t. 209. Sv. Bot.  
t. 100.  
1854. add: Häufig in Dalmatien nach  
v. IP' el den.  
1856. add: *Eupator. Solitabilis* Linn.  
non differt teste cl. Petit.  
1857. lin. 4. post 37. add: *Cac. gla-  
bula* Willd. *C. olliariaefolia* Lam.  
*Senecia glabra* Clairv.  
1860. lin. 11. add: *Bull.* t. 391. Sv.  
Bot. t. 224.  
1868. add: *comparanda* Tussil. race-  
mosa Tsch. syllog. II. 211. —  
1870. add: häufig in Dalmatien: v.  
IP' el den.  
1871. add: Häufig in Dalmatien: v.  
IP' el den.  
1876. add: auf Sandplätzen della  
Safora: Moratti.  
1878. add: *C. microcephala* Gaud.  
1879. add: Haec *C. multiflorus* Gaud.  
qui pariter errore a nobis relata in  
errorem inducere est. Specimina  
helvetica præsent anthodium quid-  
quam arachnoides - bicolorum, nos-  
tra germanicae antr. glabrius, ceterum  
non different. — Schweiz: *Valle*  
*du Lac de Joux dans le Jura*: v.  
Charr.  
1882. add: *C. axillaris* Gaud.  
1884. add: *S. C. involucratus* Be-  
cker: elatior, capitulis majoribus,  
anthodii squamis arte adpresso omni-  
bus extorris discum supererantibus:  
— pulchra planta, alterius obser-  
vanda, verosimile species distincta,  
quoniam noster semper longe humilior,  
ejus anthodium disco brevius squamis  
squarrosum, i. e. extorris retrorsis,  
medialis extorris, intimis extorris  
different. — An grasigen Feldrainen  
und Waldhängen in der Geg. von  
Frankfurt a. M.: Becker.  
1895. add: Formas hujus et affines  
iconibus accuratis demonstrabo.  
1901. add: im Mailändischen auf dem  
M. Generoso: *Composita*, *Corni*  
*di Cane* über Lagone: v. Charr.  
1903. add: *C. heterophyllum* et *in-  
volucratus* quod iterum conjuncti, sic  
explicatur ab observatore casio cl.  
*Aloysia Fischer*, ut *C. involuc-  
ratus* foliis integris, sit planta prima  
anno borens, *C. heterophyllum* fe-

*Lactuca viscosa*. Schlecht. 1. 217. Hayne Arrog. I. t. 47. Hanauer alii et alii. Bavar. Bavaria. — An Achern in Schelklingen im südlichen Odenwald, selten im mittleren und nördlichen, auf der Kalktrappe am Horz: Hämpe: an Felsen bei Eptingen bei Gießen, Frkf. a. M. nach Brecker. — Jul. Aug. ♂

1813. *L. angustata* All. Liliae integris dentatis recte basatis, rectis lato. All. ped. t. 17. f. 1. Præcedentibus tenerior. Bavar. — In der Wälde d'Aspe in Piemont, im Wallis zwischen Siders und Verrone u. a. D., im Walde von Lipizza bei Triest: Reynhold. — Jun. Jul. ♂

1813. *L. sativa* L. folia rotundata, cordata cordata, recte corymbosa, Gart. t. 2. f. 128. f. 5. Blaßw. t. 38. Hayne Arrog. VII. 50. Flora. Bavar. Unus varietas colagine liliae crispa et mucronata, et *L. palmata* IP. — Gehört. — Jul. Aug. ♂

1813. *L. sagittata* IP. Kit. folia basitentaculata profunde sagittata, interioribus oblongis basi attenuatis dentatula, superioribus basitentaculata integerrima. IP. Kit. t. 1. Trigonalis, stricta, Bavar. extus rubella. — In Ungarn in IP abdum am Gödöllö und Nagy-Károly: häufig an der Matra: bei Bratisla in Mähren: Hochst. — Jul. ♂.

1816. *L. stricta* IP. Kit. folia inferiorebus lyrate et interrupte lyrate - crenatissimis basi attenuatis amphioxylis, cordatis runcinato-pinnatifidis sagittatis, runcinata linearis, corymbis fastigiatis. IP. Kit. t. 48. *L. querina* Hoffm. Schlecht. t. 21. fruct. Sp. non *L. Cicerbita corymbosa* IP allr. *L. violace* Bellard. sp. t. IV. Trichopteridias, Bavar.

COCCEI, 5 e p. v. h. n. s. Vaill. Distelsalat. Anthod. basi imbricatis et ventricosis, rastorum connivens. Rec. usum. Achene compresso-prismaticus, poppe sessili sepalumoso. — Oba. Coce Malgodi H. Cass. aut *Cicerbita* IP allr. statutibus, monili ligatus Sanchi stirps, latifolii, leucophari, acuminati, Lact. elongata adnervata petio, quam Sanchi alpinus; Flumieri et jordanius vix jure separantur. —

#### a. *Malgodium* H. Cass. force corollis:

1820. *S. alpinus* L. var. raceme-glandulosus - hispida bracteata, folia pinnatifido-fusculentia basi sagittata glabra subtra planata, folio terminali maximo deltoides acuminata. Pl. D. 182. Nr. Bar. 637. *S. montanus* H. Cass. *S. cedroides* L. sp. Hieracium cedroides Scop. Cicerbita al-

pis: rhombia complanata, stipite six calcarum distillatum longo: fol. laticinis rhombico levigata et lato transverso, latitatis recte dentata. — In IP abdum in Ungara, Croation, Piemont, in Sachsen & Pflugl, Thüringen. — Juni-Aug. ♂

1817. *L. personata* L. folia cordata planitidis, basi linearibus curvatis curvata dentata, floribus corymbosis-paniculatis. Mill. in t. 157. Dolach. hist. 106. f. 2. Pedalia et ultra, runcinata, corymba paniculantes, capitula majora quam reliquorum, flava, exserta; achene uncinis complanata, stipite transverso. — Auf trocknen Hügeln, Kalkfelsen, IP abdum, im ganzen südlichen Gebiete, im mittleren u. nördlichen weiter. — Mai. Juni. ♀

1818. *L. querina* L. folia subcordata linearibus inferioribus rotundatis dentatula, basi dilatata sagittatis, superioribus basitentaculata apiculatis, pinnatis stricta. Folia supra et inferiores rotundata basi dentata. Plantae perenni exsita. Achene basitentaculata nigra muricato-schrebe stipite rigido cylindrum longitudine, pubescens dense, oblonga, capitula plus duplo minoria quam præcedentia. — (Geb. der Freib Cassione in Julianischen Meere nach Linn.) Häufig im Tritter Busche bei Berlin nach Schollier; am Unterharz: Hämpe. — Jul. ♀

1820. *L. regalis* Bals. folia inferiorebus basitentaculata glandulato-dentata basi attenuatis cordatis, superioribus basitentaculata sagittatis, recte rotundata. Semperdolis divisa: f. purpurei in apice glandulorum solitarii. Num hujus generis? — Um Sora in Piemont nach All. ♂

pina IP allr. *S. laevius austriaca* Clus. CXLVII. f. 1. Flor. annua, inflorescentia force-hispida, glandulosa, schrebe elongata, lata linearis, subrecta, vix attenuata, canina Sanchi. — In Gebirgswalden, Vorbergen auf IP abdum, zwischen Gräben an Felsen. — Jul. Aug. ♀