

longis oppositifoliis in laxos pseudo-racemos dispositis; phyllariis intimis ensiformibus obtusis post anthesin vix basi incrassatis, extimis parvis ovato-acutis; achæniis vix compressis 4-gonis costis 1-2 in quoque facie conspicuis, infra angustatis, apice in rostrum longum abrupte productis; pappi setis serrulatis.

Socotra, in campis. B.C.S. Nos. 217, 595. Schweinf. No. 398.

84. *LACTUCA CRASSIFOLIA*, *Balf. fil.*: herba perenna glabra glauca valida divaricatim breviter ramosa; foliis crassiusculis lyrato-pinnatifidis, segmento terminali oblongo-acuto v. obtuso calloso-dentato et saepè inaequaliter lobato, lobis inferioribus irregulariter ad basin minoribus, radicalibus vix petiolatis amplexicaulibus, caulinibus sessilibus auriculatis; capitulis 20-floris  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  poll. longis oppositifoliis in pseudo-racemos breves dispositis; phyllariis intimis aequalibus linearibus marginatis, extimis paucis late ovatis minoribus; achæniis basi truncatis in rostrum breve pallidum productis; setis pappi scabridulis achæniis æquilongis.

Socotra, in campis. B.C.S. No. 595.

85. *PRENANTHES AMABILIS*, *Balf. fil.*: herba perennis cano-lanuginosa caule erecto in inflorescentiam abeunte; foliis lyrato-runcinatis, lobo terminali rotundato v. acute lobato parte inferiore saepè angustissimo, amplexicaulibus axillariter lanato-villosis membranaceis glabris; capitulis longe pedunculatis 5-6-floris in laxe ramosas paniculas dispositis; phyllariis intimis 5-6 linearibus acutis, exterioribus brevibus; achæniis tetragonis truncatis basi angustatis pappo sordido setoso serrulato brevioribus.

Socotra, in montibus prope Gollonsir. B.C.S. No. 311.

86. *LAUNEA CREPOIDES*, *Balf. fil.*: herba rosulata glabra perennis; foliis spathulatis v. oblanceolatis basi longe attenuatis obtusis integris; capitulis solitariis in apices scaporum longorum bracteolarum v. in laxas 2-3-ramosas cymas dispositis; phyllariis intimis 8 linearibus; calyculi squamis paucis ovatis herbaceis; styli lobis setulis nigris suffultis; achæniis linearibus subfusiformibus multo-costatis rugosis; pappo exteriore lanoso-intricato, intimo setoso.

Socotra, in montibus non infrequens. B.C.S. No. 307. Schweinf. No. 570.