

Fleurs tubuleuses; celles du centre saillantes, glanduleuses sur les côtés ;

Akène chauve, aplati.

*Diagnose latine.*

*Caulis* rectus, striatus, villosoglandulosus, brevis (10-15 centim.), a basi ramosus ;

*Folia* alterna, petiolata, lanato-villosa, longissima, lobis dentatis valde remotis, lobulis intervalla obtinentibus ;

*Corymbus* angustus, pedicellis longis, villosoglandulosus ;

*Capitula* parva, hemisphaerica, stipata ; involucrium phyllis villosis subaequalibus ;

*Flosculi* tubulosi, ex centro eminentes, utrinque ad latera glandulosi ;

*Akenium* calvum, compressum.

Cette espèce, voisine du *D. latifolia* DC., s'en distingue à première vue par ses feuilles très longues et divisées en un grand nombre de lobes alternativement grands et petits.

Chine, Kouy-tcheou, dans le midi, bords du fleuve Hoâ Kiang, à Ouang-mou.

Belles fleurs bleues ; odeur de camomille (Note du Collecteur).

A. Schotter legit, décembre 1897. Herbarium Bodinier, sans num.

***Lactuca (Chorisma) crepidioides sp. nov.***

Racine grosse, noueuse, un peu rampante, donnant naissance à plusieurs tiges ;

Tige herbacée, glabre, très rameuse, striée ;

Feuilles radicales très allongées, rétrécies en court pétiole, longuement acuminées, à quelques grosses dents donnant à la feuille un aspect pinnatifide ; vertes et glabres sur les deux faces ; feuilles caulinaires sessiles, largement embrassantes ;

Capitules relativement grands, 12-20 flores ; involucre à folioles longues, obtuses, glabres, entourées à la base de folioles très courtes en forme de calicule ;

Fleurons jaunes ; aigrette à poils blancs, simples, plus courte que la fleur, 4 fois plus longue que l'akène ; celui-ci strié, court, aussi large que haut, comprimé, étranglé brusquement en un bec plus court que lui et surmonté d'un disque ou capsule portant l'aigrette.

*Diagnose latine*

Radix crassa, nodosa, subrepens, aliquot caules emittens ;  
 Caulis herbaceus, glaber, striatus, in plures ramos divisus ;  
 Folia radicalia anguste elongata, in brevem petiolum attenuata,  
 longe acuminata, cum aliquot elongatis dentibus quorum gratia  
 pinnatifida videntur ; viridia utrinque et glabra ; caulina sessilia  
 late amplexicaulia ;

Capitula pro habitu magna, 12-20 flora ; involucrum phyllis  
 longis, obtusis, glabris, ad basim foliolis brevibus calyculum  
 effingentibus ;

Flosculi lutei ; pappi setae albae, simplices, flosculo breviores,  
 quadruplo longiores akeniis ; akenium striatum, breve, æque  
 altum et latum, compressum, subito constrictum in rostrum  
 ipso brevius, et deinde dilatatum in discum vel cupulam pappo  
 coronatam.

Cette espèce offre au premier coup d'œil l'aspect d'un *Crepis virens* de petite taille.

Chine, environs de Yun-nan-sen. C. sur les berges des canaux,  
 rizières.

Fleurs jaunes.

Em. Bodinier legit, mars 1897. Herbar Bodinier, sans numéro.

**Lactuca** (*Sororia*) **diversifolia** sp. nov.

Tige herbacée, grêle, glabre, finement striée, atteignant 70-80  
 centimètres ;

Feuilles à formes très variées : les radicales longuement pétiolées,  
 profondément cordées, à peu près quadrangulaires, entières,  
 lâchement et finement dentées, légèrement ciliées, glabres  
 excepté sur les nervures ; les caulinaires inférieures pétiolées,  
 cordées à la base, divisées en trois lobes : deux latéraux médiocres,  
 arrondis, denticulés, placés de chaque côté à des hauteurs  
 un peu différentes ; le terminal très grand, triangulaire, sublobé,  
 denté ; tous les trois à nervures bien apparentes ; les caulinaires  
 supérieures à pétiole ailé, à limbe triangulaire denté ; devenant  
 enfin très étroites sous la panicule ;

Panicule médiocrement ample, à rameaux divergents courts,  
 divisés en pédicelles monocéphales ;