

Diagnose latine

Radix crassa, nodosa, subrepens, aliquot caules emittens ;
Caulis herbaceus, glaber, striatus, in plures ramos divisus ;
Folia radicalia anguste elongata, in brevem petiolum attenuata, longe acuminata, cum aliquot elongatis dentibus quorum gratia pinnatifida videntur ; viridia utrinque et glabra ; caulina sessilia late amplexicaulia ;

Capitula pro habitu magna, 12-20 flora ; involucrum phyllis longis, obtusis, glabris, ad basim foliolis brevibus calyculum effingentibus ;

Flosculi lutei ; pappi setae albae, simplices, flosculo breviores, quadruplo longiores akeniis ; akenium striatum, breve, æque altum et latum, compressum, subito constrictum in rostrum ipso brevius, et deinde dilatatum in discum vel cupulam pappo coronatam.

Cette espèce offre au premier coup d'œil l'aspect d'un *Crepis virens* de petite taille.

Chine, environs de Yun-nan-sen. C. sur les berges des canaux, rizières.

Fleurs jaunes.

Em. Bodinier legit, mars 1897. Herbar Bodinier, sans numéro.

Lactuca (Sororia) diversifolia sp. nov.

Tige herbacée, grêle, glabre, finement striée, atteignant 70-80 centimètres ;

Feuilles à formes très variées : les radicales longuement pétio- lées, profondément cordées, à peu près quadrangulaires, entières, lâchement et finement dentées, légèrement ciliées, glabres excepté sur les nervures ; les caulinares inférieures pétio- lées, cordées à la base, divisées en trois lobes : deux latéraux médiocres, arrondis, denticulés, placés de chaque côté à des hauteurs un peu différentes ; le terminal très grand, triangulaire, sublobé, denté ; tous les trois à nervures bien apparentes ; les caulinares supérieures à pétiole ailé, à limbe triangulaire denté ; devenant enfin très étroites sous la panicule ;

Panicule médiocrement ample, à rameaux divergents courts, divisés en pédicelles monocéphales ;

Capitules très étroits (larg. 1 mm., long. 10 mm., avant la fructification), 4-6 flores, roses;

Involucre formé de 5 folioles longues, étroites, et de bractéoles en forme de calicule;

Aigrette non plumeuse, blanche; akène noir, non comprimé, à côtes; atténué légèrement en un bec très court, épais, blanchâtre au sommet.

Diagnose latine

Caulis herbaceus, gracilis, glaber, tenuiter striatus, 70-80 centim. altus;

Folia valde polymorpha: radicalia longe petiolata, cordata, integra, quadrangula, laxa et tenuiter dentata, leviter ciliata et ad nervos aliquantum puberula; caulina inferiora petiolata, cordata, divisa in tres lobos dentatos, nervis apparentibus præditos; laterales duos, mediocres, rotundatos, hinc et hinc altitudine nonnihil diversa positos; terminalem magnum, triangulum, sublobatum; caulina superiora petiolo alato et limbo triangulo dentato constantia; sub paniculo tandem angusta;

Panicula mediocriter ampla, ramis divaricatis non longis, in pedicellos monocephalos desinentibus;

Capitula longa et ante fructificationem angusta (longa 10 mm. lata 1 mm.); 4-6 flora, rosea; involucrum quinque phyllis longis et angustis, brevissimoque calyculo constans;

Pappus non plumosus, albus; akenium nigrum, non compressum, costatum, leviter attenuatum in rostrum brevissimum, crassum, apice subalbidum.

Cette espèce appartient à la section *Sororia* Fr., subdivision de la section *Mycelis*.

L'herbier Bodinier possède deux échantillons de cette espèce.

1° Chine, Kouy-tcheou, environs de Kouy-yang, bois de Kien-lin-Chan. Fleurs roses; tiges et feuilles très variables de hauteur et de forme. (Note du collecteur.) Bodinier legit, 7 juillet 1898. n° 2400.

2° Chine, Kouy-tcheou, environs de Tou-Chan. J. Cavalerie legit, juin 1898, Même numéro.

(A suivre).