

- lanceolatis integerrimis, squamis invol. laxis. — in Armeniâ. *L. Orientalis* Dentis-leonis folio flore leucophæo Tourn. cor. 35.
27. *L. AUGUSTANA* (All. ped. n. 823. t. 52. f. 1), caule erecto glabro tereti apice paniculato, foliis subtus lævibus oblongo-lanceolatis ciliato-denticulatis basi sagittatis, inferioribus non sinuatis, achæniis striatis rostro ferè brevioribus. ① in arenosis Pedemontii in vallibus Augustanâ, Segusianâ, etc. (All. Ball.!), in humidis et cultis Persiæ circa Erivan (Szow.!), in Ægypto super. (Sieb!). Proxima *L. virosæ*, sed carina lævis nec setosa. (v. s.)
28. *L. DREGEANÂ*, caule erecto tereti basi simplici setis aculeiformibus hispido apice glabro paniculato, foliis carinâ aculeatis sagittato-semiamplexicaulibus, inferioribus dentato-runcinatis et ciliato-spinulosis, superioribus integerrimis, omnibus longè acuminatis, achæniis striatis rostro paulò brevioribus. ②? ad Cap. Bonæ-Spei in Cannaland (Thunb.), ad Zneurobergen (Drege!). *Lact. virosa* Thunb. fl. cap. p. 614 non Linn. (v. s. comm. à cl. Drege.)
29. *L. VIROSA* (Linn. sp. 1119), caule erecto tereti basi glabro aut aculeato-setoso apice paniculato, foliis horizontalibus carinâ aculeato-setosis acutè denticulatis obtusis basi sagittatis, infimis sinuatis, achæniis striatis rostro ferè brevioribus. ① in aggeribus et sepibus Europæ mediæ et præsertim australis. *L. sinuata* Forsk. æg. p. 215. — Moris. ox. s. 7. t. 2. f. 16. Herba odore gravi. Succus præ cæteris narcoticus. (v. v.)
- β. maculata*, foliis radicalibus obovatis purpureo-maculatis. — *L. maculata* Horn. h. hafn. 2. p. 755. (v. s. c.)
- γ? ambigua*, foliis radicalibus obovatis immaculatis. — patr. ign. *L. ambigua* Schrad.! obs. in cat. h. goett. 1834. ann. sc. nat. 1836. v. 6. p. 99. *L. virosa* Heyn. arzn. gew. 1. t. 47. Odor plantæ cultæ ex Schrad. nullus. (v. s. comm. à cl. Schrad.)
30. *L. SCARIOLA* (Linn. sp. 1119), caule erecto tereti basi glabro aut setis hispido apice paniculato, foliis verticalibus carinâ aculeato-setosis apice acutis basi sagittatis runcinato-pinnatifidis, achæniis striatis rostro ferè brevioribus. ① Linn. ② Sm. in convallibus et ruderalis Europæ mediæ et australis à Tauriâ (Stev.) ad Maderam (Lowe!), in Galliâ, Germaniâ, Angliâ, etc. Heyn. arzn. gew. 1. t. 47. opt. *L. sylvestris* Cam. epit. 300. ic. Lam. dict. 3. p. 406. *L. sylvestris β* Lam. fl. fr. 2. p. 84. *L. verticalis* Gater. fl. mont. 138. (v. v.)
- β. maculosa*, foliis sanguineis maculis adpersis. — Herm. parad. t. 191.
- γ. plicata*, carinâ foliis inermi. — in Græciâ ad Megaram. *L. plicata* Balb.! cat. h. taur. 1813. p. 45. (v. s.)
31. *L. CRETICA* (Desf. ann. mus. 11. p. 160. t. 19. cor. Tourn. 44. t. 34), glabra, caule simplici tereti, foliis pinnatifido-dentatis, superis squamiformibus integerrimis acutis canlem ambientibus, racemo terminali, capitulis breviter pedicellatis bracteolatis, achænio rostro triplò ferè breviorè. — in insulâ Crêtâ (Tourn.), Melo, Therâ et Astypalæâ copiosè in aridis (d'Urv. enum. p. 99). *L. Cretica* Sonchi folio flore pulchro Tourn. cor. 35. Flores lutei magnit. *L. pennensis*. Antheræ violacæ (Desf.). (v. s.)
32. *L. ELONGATA* (Muhl. in Willd. sp. 3. p. 1525), caule erecto tereti folioso apice paniculato, foliis subtus lævibus runcinatis basi attenuatis, lobis acuminatis subdentatis, summis lanceolatis integerrimis, paniculâ laxâ, pedicellis bracteolatis. *℥? Ell.* ② Beck. in Americâ bor. à Canadâ ad Carolinam præcipuè in campis recentè ustis undè *Fire-Weed* ab Anglo-Americanis dicitur, ad lacum Huron (Hook.). Ell. sketch 2. p. 252. Beck bot. 169. *L. Caroliniana* Walt. car. 193. *L. longifolia* Michx. fl. bor. am. 2. p. 85. *L. procera* Schrad. ex Balb. h. taur. Variat caule glabro et in specim. Torreyano infernè setis sparsis hispido. Achænia compressa lævia rostro sublongiora. (v. s. comm. à cl. Bosc et Torr.)
33. *L. INTEGRIFOLIA* (Bigel. bot. ed. 2. p. 287 non Nutt.), caule tereti striato apice confertè paniculato, foliis sessilibus lanceolatis basi sagittatis subtus