

Habitat in insula Carolina Baltici; in Germania. 24

(v. f.)

Folia inferiora caulina pinnatifido-runcinata acuta denticulata basi dilatata amplexicaulia; superiora, a medio caulis ad apicem usque, lineari-lanceolata sagittata integerrima basi tantum dentata. W.

* 7. *LACTUCA stricta:*

L. foliis subtus laevibus, radicalibus infimisque runcinato-lyratis dentatis, superioribus runcinato-pinnatifidis basi angustatis sagittatis, floribus corymbosis. W.

L. (*stricta*) laevis, foliis inferioribus runcinatis, superioribus pinnatifido-laciniatis, linnis integerrimis, floribus corymbosis caule stricto. *Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 1. p. 47. t. 48.**

Lactuca vialea. *Bellarđi.*

Habitat in nemorosis Hungariae, Italiae. ♂ (v. f.)

A. L. *quercina distincta*: foliis radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis basi angustatis, floribus corymbosis. W.

* 8. *LACTUCA Chaixi.*

L. foliis subtus laevibus, radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis lanceolatis dentatis, basi sagittatis, lobis truncatis apice dentatis, floribus racemosis. W.

L. (*Chaixi*) foliis laevibus, radicalibus lyratis, caulinis sagittatis, postice eroso-dentatis, supremis integris, floribus spicatis. *Villars delph. 3. p. 154. t. 32.**

Französischer Salat. W.

Habitat in Delphinatu. ☉

* 9. *LACTUCA elongata:*

L. foliis subtus laevibus, inferioribus runcinatis integerrimis amplexicaulis, superioribus lanceolatis sessilibus, floribus racemosis. W.

Lactuca elongata. *Mühlenb. in litt.*

Langähriger Salat. W.

Habitat in Pensylvania. (v. f.)

Folia inferiora 4 - vel 5 - pollicaria runcinata *Sisymbrii integerrima*, lobis acuminatis, basi amplexicaulia, superiora sesqui-f. bipollicaria angusto-lanceolata, lobo uno alterove obsoleto instructa integerrima, basi pt-

*tenuata sessilia non amplexicaulia. Racemus quadri-
pollicaris terminalis. W.*

* 10. **LACTUCA capensis.** †

L. foliis runcinato-pinnatifidis glabris, caule debili.

Thunb. prod. 139.

Capischer Salat. W.

Habitat ad Cap. b. Spei.

11. **LACTUCA Scariola.**

L. foliis verticalibus carina aculeatis apice acutis, basi sagittatis, runcinato-pinnatifidis. W.

*L. foliis verticalibus carina aculeatis. Amoen. acad. 4.
p. 328. * Neck. gallob. 324. Pollich. pal. n. 728.*

*Mattusch. fil. 560. Hoffm. germ. 276. Roth. germ.
I. 338. II. 258.*

L. foliis semipinnatis, nervo spinoso. Hall. helv. n. 14.

L. sylvestris costa spinosa. Bauh. pin. 123.

*L. sylvestris laciniata. Moris. hist. 3. p. 58. f. 7. t. 2.
f. 17.*

Endivia major lactucina spinosa. Barr. ic. 135. R.

Lactuca agrestis. Cord. p. 157. R.

β *L. sylvestris italica, costa spinosa, sanguineis maculis ad-
spersa. Herm. parad. 191. t. 191.*

γ *L. sylvestris annua, costa spinosa, folio integro colore
caesio. Moris. hist. 3. p. 58.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 35.

Wilder Salat. W.

Habitat in Europa australi. ☉ (v. v.)

Folia radicalia sinuata. Rai.

*In γ. Folia inferiora runcinata, obliqua f. verticalia;
Caulina superiora amplexicaulia, sagittata, carina lae-
vi, margine scabro.*

12. **LACTUCA virosa.**

*L. foliis horizontalibus carina aculeatis denticulatis, api-
ce obtusis, basi sagittatis, oblongo-lanceolatis, infimis
sinuatis. W.*

*L. foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. Sp. pl.
1119. Gouan. monsp. 408. Grim. isen. in Nov. Act.*

A. N. C. tom. 4. p. 84. Scop. carn. n. 960. Doer.

nass. p. 136. Hoffm. Germ. 276. Roth. germ. I. 338.

II. 258. Thunb. prod. 139?