

longues et assez larges, à folioles extérieures plus petites et simulant un calicule ; fleurs peu nombreuses (8-10) ; jaunes ;

Aigrette simple, blanche, dépassant bien l'involucre ;

Akène roux, atténué en bec court, à 6-8 côtes.

Diagnose latine.

Radix dura, promittens plures caules ligneos, striatos, glabros, divisos a basi in plures ramos iterum divisos in ramusculos monocephalos, erectos, corymbum angustum constituentes ;

Folia radicalia et caulina rara, linearia, curta, plantam quasi nudam et siccam exhibentia ;

Capitula multa, mediocria ; involucrem phyllis interioribus longis atque largis, exterioribus parvis in modum calyculi circumpositis ;

Flores pauci (8-10), lutei ;

Pappus simplex, albus, involucrem bene superans ;

Akenium rufum, in rostrum breve attenuatum, 6-8 costatum.

Plante d'un aspect étrange, ligneuse, rappelant une bruyère privée de ses feuilles ; les quelques feuilles linéaires qu'on aperçoit sur les tiges et les rameaux sont insuffisantes à en dissimuler la nudité et la sécheresse.

Chine, Kouy-tchéou : entre Hin-y-fou et le fleuve Hoakiang ; çà et là dans les cultures.

Emile Bodinier legit, 19 avril 1897. Herbar Bodinier, n° 1561.

Lactuca (Ixeris) erythrocarpa sp. n.

Racine grosse ; tige s'épanouissant dès la base en rameaux formant éventail, striée, glabrescente ;

Feuilles rappelant celles du *L. muralis*, mais moins grandes, à lobe terminal grand, triangulaire ; glabres, vertes, mais pâles en dessous ;

Inflorescence en corymbe très étalé ; capitules nombreux, petits, à fleurons jaunes pauciflores (6-8) ; involucre à folioles extérieures longues, étroites ; à folioles extérieures petites, en forme de calicule ;

Aigrette à poils simples ;

Akène d'une couleur de brique très caractéristique ; atténué à la

base, se terminant au sommet en un bec 3-4 fois plus court que lui, à côtes (8-10) dont deux plus larges, presque en forme d'ailes étroites.

Diagnose latine.

Radix crassa; caulis statim a basi divisus et quasi in flabellum expansus, striatus, glabrescens;

Folia, ut illa *Lactucæ muralis* sed minora, lobo terminali triangulo majori, glabra, viridia sed infra pallidiora;

Inflorescentia late corymbosa; capitula multa, parva, lutea, pauciflora; involucrium phyllis exterioribus longis, angustis, acutis; exterioribus parvis ad modum calyculi;

Pappus albus, pilis simplicibus;

Akenium insigne colore rubro, latericio; ad basim attenuatum, apice in collum ipso quadruplo brevius angustatum, costis (8-10), quarum una et altera in alas angustas acutae videntur.

Chine, Kouy-tchéou; Kouy-yang. C. sur les murs des jardins; rocailles.

Emile Bodinier legit, 15 juin 1899. Herbar Bodinier, n° 2621.

***Lactuca (Myrcelis) pseudosenecio* sp. n.**

Racine grosse, donnant naissance à plusieurs tiges glabres, striées, très grêles et très hautes, se divisant en rameaux, portant à diverses hauteurs et aux extrémités des fleurs agglomérées;

Feuilles radicales, longuement pétiolées, roncînées-ondulées; à dernier segment arrondi beaucoup plus grand que les autres; rappelant bien celles du *Senecio aquaticus*; glabres, à page inférieure plus pâle; les caulinares pétiolées, roncînées, à lobes garnis de longues dents;

Capitules très petits, nombreux, à longs pédicelles munis de bractéoles;

Involucre à folioles intérieures longues, étroites; à folioles extérieures courtes, en calicule;

Fleurs relativement nombreuses (12-14) pour la grosseur du capitule, jaunes;

Aigrette simple, blonde, égalant l'involucre sans le dépasser;

Akène très petit, cendré, aplati, un peu ailé, paraissant lisse, atténué en un bec très court, épais. (A suivre).