

- apricis Hispaniæ (Willd.), ad Malagam (Boiss.), Barcellonam (Req.! Guss.), in Agro Ruscinonensi ad Olette et Villefranche (DC!) et circè Narbonam ad S. Paul de Fenoullhedes (Pourr.). Willd. sp. 3. p. 1529. DC. fl. fr. n. 2891. L. perennis γ. Lam. dict. 3. p. 409. Capitula minora quam L. perenniæ. Variat in locis montanis glabra, in calidis tota hispida, obs. cl. E. Boissier. (v. s. et v.)
12. L. SEGUSIANA (Balb. I elench. fl. taur. 94. misc. p. 37. t. 8), glabra, caule erecto ramosissimo, foliis inferioribus attenuatis sessilibus, superioribus linearibus sagittatis, ramis 1-cephalis bracteolatis, invol. squamis linearibus, achæno lœvi rostro æquali. (2) in cibibus et vineis Pedemontii propè Segusium detex. cl. Balbis. Willd. sp. 3. p. 1529. DC. fl. fr. n. 2892. Achænia fusca, interdùm chermesina. Species L. tenerimæ valde affinis. (v. s.)
13. L. UNDULATA (Ledeb. fl. alt. 4. p. 156. ill. 2. t. 129), glabra glauca, caule simplici, foliis radicalibus obovatis lyrate, floralibus integris, caulinis pinnatidis undulatis, lobis inferiorum oblongo-lanceolatis subintegerrimis, capitulis corymboso-paniculatis, achæniis rostro quadruplo et ultra brevioribus. (1) in Sibiria Altaicæ montibus Arkan et Dolen-Kara (Meyér), in glareosis ad torrentem Lavin prov. Aderbeischan (Szow.). Herba 6-10 poll. (v. s. comm. à cl. Fisch.)
- β. dentata, minor, foliis dentatis. (1) ad radices montis Sinæ loco Bestand dicto legit cl. Schimper pl. exs. n. 128! (v. s.)
14. L. DISSECTA (Don prod. fl. nep. 164), caule erecto piloso ramoso, foliis interrupè bipinnatifidis pilosiusculis, lobis rhombis dentatis, petiolis amplexicaulis basi sagittatis, paniculâ corymbosâ diffusa, pedicellis nudiusculis, achaenio punctato rostro breviore. (1) in Nepaliâ. Flores cœrulei.
15. L. FISCHERIANA, glabra, caulinis è collo plurimis erectis paucifoliis, foliis radicalibus linearibus integerrimis, caulinis linear-lanceolatis amplexicaulis. subdentatis, paniculâ corymbosâ, invol. adpressè calyculato flosculis dimidiò breviore. (2) in Sibiria. Prenanthes graminea Fisch. mem. soc. nat. mosc. 3. p. 67. Cor. purpureæ. Flores in invol. 15. Achænia sulcata oblonga rotata. Ex his caract. potius Lactuæ quam Prenanthi adnumeranda sed mihi ignota.
- §. 2. Xanthinæ, nempè floribus constanter flavis.
16. L. GLABRA (DC. in Wight contr. p. 26), glabra, caule nudo dichotomè ramoso foliis æquali aut paulò longiore, foliis elongato-linearibus rigidulis acutis nunc integerrimis, nunc rigidulè ciliato-serratis, capitulis corymbosis longè pedicellatis cylindraceis circ. 7-8-floris, involucro squamellis lanceolatis calyculato, squamis 5-6 linear-lanceolatis margine subscariosis calyculo triplò longioribus, achæniis in rostrum brevè productis. (2) in Indiâ orient. ad Neelgerry, Kaleduy. Prenanthes glabra Heyn. in Wall. cat. comp. n. 374. Denticuli foliorum subnalli aut sèpius retrorsi. Folia 2-3 poll. longa, 2 lin. lata. (v. s. comm ab hon. cœt. merc. angl. Ind. or.)
17. L. RIGIDA, glabra, caule gracili subangulato, foliis late-linearibus sessilibus, integerrimis rigidulis uninerviis, paniculâ laxâ, pedicellis elongatis bracteolatis, capitulis cylindraceis 8-floris, invol. squamis 5-margine scariosis constante-bracteolis triplò brevioribus calyculato, achæniis breviter. rostratis. — in Indiâ orient. ad Bayisi seu Baysi legit cl. Hamilton. Prenanthes rigida Ham. in Wall. cat. comp. n. 373. (v. s. specim. imperfect. in h. hon. cœt. merc. Ind. or.)
18. L. LONGIFOLIA (DC. non Lam. nec Michx.), glabra, caule tereti erecto apicè laxè paniculato-corymboso, foliis linear-lanceolatis elongatis acuminatis integerrimis sessilibus hastato-auriculatis, auriculis acuminatis, pedicellis bracteolatis, capitulis 17-20-floris, invol. squamis exter. lanceolatis, int. linearibus duplò triplò longioribus, rostro achæniæ ferè longitudinem æquante. (2) in Nepaliâ, Kamaon et ad Srinaghur legit cl. Wallich. Chondrilla longifolia.