

CLASSIS XIX.
SYNGENESIA.

SCORZONERA.

54. SCORZONERA TINGITANA.

DESCR. *Radix* annua, fusiformis. *Caules* brevissimi, semipoll. diffusi, foliorum basi tecti. *Folia* bipoll. amplexicaulia, confertissima, lanceolata, extrorsum dentato - sinuata; laciniæ denticulatæ, ciliatæ. *Pedunculi* terminales, axillares, patentes. Axillares nudi, terminales, squama sub flore unica lineari - lanceolata, margine membranacea. *Calyx* basi gibbus. Squamæ inferiores laxæ, apice reflexæ. *Corollæ* flavæ. *Semina* 4 - angula, 4 - sulcata, versus basin latiora, tuberculata: rarum visu in Sygenesia.

In desertis arenosis *Káhirinis*. Arab. *Nuggd.* نكد Nulla pecora planta hac vescuntur, ne Cameli quidem, foli Asini non aspernantur.

55. SCORZONERA CILIATA; caule procumbente, ramoso, scabro; pedunculis squamosis; foliis retrorsum, alternatim obtuse sinuato - dentatis, glabris, margine aculeis ciliatis.

DESCR. *Radix* fibrosa, fusiformis. *Calyx* erectus: laciniæ intimæ multo longiores, lanceolatæ; reliquæ ovatæ; omnes virides, margine albo, tenuissimo.

Alexandriæ. Arab. *Schadæid.* Aliis *Hauve.* حو

PICRIS.

56. PICRIS SCABRA.

DESCR. *Caulis* squamis 3 remotis, linearibus, erectis; *Flore* sæpe unico, terminali. *Folia* repando - undulata, setis hispida, ut & scapus & calyx. *Semina* transversim striata. *Pappus* pedunculatus, plumosus.

In monte *Chádra.* Arab. *Murreir.*

LACTUCA.

57. LACTUCA FLAVA; floribus ligulatis, flavis.

DESCR. *Caules* dichotomo - ramosi; squama sub singulo ramo. *Folia* radicalia lyrato - sinuata; margine spinulis confertis mucronulata, caulina pauca, sinuata, amplexicaulia. *Calyx* calyculato - imbricatus, calyculo latere membranaceo. *Semina* scabra. *Pappus* stipitatus. *Receptaculum* nudum.

Surdúd. Arab. *Hindibe.* هندب

58. LACTUCA