

CREPIS L.

102. **Crepis Rueppellii** Schultz Bip. in Flora XXII (1839) p. 20 et in Mus. Senckenb. III. (1839) p. 57; Oliver a. Hiern *Fl. Trop. Afr.* III. p. 450; Schweinf. *Fl. Abyss. sept. Colon. Eritr.* (1892) n. 1376! 1734!

= *Crepis adenotrix* Schultz Bip. apud Schimper *Pl. Abyss.* ed. Hohen. (1852) n. 217.

= *Barkaussia adenotrix* A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* I. p. 465.

= *Picris sulphurea* Schweinf. *Fl. Abyss. Sept. Col. Eritr.* (1892) n. 1239^{bis}
Assaorta: Monte Urug, 2547 m. circa, 22. III. 1893 (P. n. 3450).

Amasen: Asmara, 2. V. 1892 (T. P. n. 1167, 1197); Asmara, 2400 m., 3. V. 1893 (T. P. n. 2414); Asmara-Ad Taclesan, 5. V. 1892 (T. P. n. 1198); Ad Taclesan, 2200 m., 11. II. 1893 (T. P. n. 346); Belesa, 2200 m., 13. II. 1893 (T. P. n. 333); Asmara-Belesa, 2400 m., 4. V. 1893 (T. P. n. 2559).

Oculè Cusai: Halai, 1900 m. circa, 27. III. 1893 (P. n. 3909); Uagarti-Saharti, 2200 m. circa, 17. IV. 1893 (P. n. 4299); Saganeiti-Acrur, 1900 m. circa, 25. III. 1893 (P. n. 3830).

LACTUCA L.

103. **Lactuca capensis** Thumb. *Fl. Cap.* p. 614; Harv. *Fl. Cap.* III. p. 526; Oliver a. Hiern *Fl. Trop. Afr.* III. p. 452.

Amasen: Asmara, 1. V. 1892 (T. P. n. 1176); Asmara-Az Taclesan, 5. V. 1892 (T. P. n. 1175); Asmara-Belesa, 2400 m., 4. V. 1893 (T. P. n. 2540); Belesa, 2200 m., 13. II. 1893 (T. P. n. 336); Sciumma-Negus 2200 m., 11. II. 1893 (T. P. n. 358).

104. **Lactuca goraeensis** (Lam.) Schultz Bip. in Flora (1842) p. 422; Oliver a. Hiern *Fl. Trop. Afr.* III. p. 452; Schweinf. *Fl. Abyss. Sept. Col. Eritr.* (1892) n. 513! 1213!

= *Sonchus goraeensis* Lamk. *Encycl.* III, p. 397.

= *Microrhynchus octophyllus* Hochst. ap. Schimper *Pl. Abyss.* Ed. Hohen. n. 1448.

Arcipelago Dahalak: Isola Duh Racaham, 15. III. 1892 (T. n. 590); I. Duh Rij Rij, 12. III. 1892 (T. P. n. 27); I. Dahalak Cumbeibak-Ras Antolo, 11-12. III. 1892 (T. n. 597); Nocra, 12. III. 1892 (T. n. 595); I. Sciumma, 18-27. III. 1892 (T. n. 593); I. Sarad, 10-11. III. 1892 (T. n. 592); I. Harat, 9. IV. 1893 (P. n. 4528); I. Dar Gullah, 15. III. 1892 (T. n. 560).

Damoeita: Isola Um Namus, 17. III. 1892 (T. n. 598); I. Hotha, 8. III. 1892 (T. n. 594); I. Assarka nord. 19. III. 1892 (T. n. 591); I. Midir, 22. III. 1892 (T. n. 1180).

Samhar: Isola Scek Said, 3. III. 1892 (T. P. n. 11).

H a b a b: Acque di Aidè, 21. VI. 1892 (T. P. n. 1178); Valle del Mao, 18. V. 1892 (T. P. n. 1777).

A s s a o r t a: Ingal, 9. III. 1892 (T. P. n. 24); Ingal-Ras Koral, 9. III. 1892 (T. n. 27); Tata-Farras Kankisce, 200 m. circa, 17. III. 1893 (P. n. 2905); Otumlo, 16 III. 1892 (Ragazzi e Pappi, n. 1223); Ras Amas-Ras Tucul, 16. III. 1892 (T. n. 72).

M e n s a: Monte Agarò, 1800-2400 m., 18. I. 1893 (T. P. n. 497); Colfù [Bogasà]-Adinalai, 1900 m., 15. II. 1903 (T. P. n. 1133-1138).

B o g o s: La Lamba, 2000 m. circa, 3. III. 1893 (T. P. n. 2615); Keren-Dari, 1600 m. circa, 2. II. 1893 (T. P. n. 2675); Abi Mandel-Alibaret, 2000 m. circa, 5. II. 1893 (T. P. n. 2506).

B a r c a: Agordat, 500 m. circa, 27-30. I. 1893 (T. P. n. 2784).

O c u l è C u s a i: Jangus-Ambatocam, 200 m. circa, 12. IV. 1893 (P. n. 4017).
var. **effusa** Chiov.

Panicula valde ramosa, ramis tenuioribus, divaricatis; capitulis in pedicellis aequi vel paulo longioribus insidentibus.

A r c i p e l a g o D a h a l a k: Isola Dahalak-Chebir, 27-28. III. 1892 (T. n. 576).

A s s a o r t a: Laghetto di Mainat, 1500 m. circa, 21. III. 1893 (P. n. 3285).

Osservazioni. — Negli individui i cui cauli fioriferi sono stati troncati, germogliano nuovi rami fioriferi, i quali presentano i capolini pedicellati e quindi coi caratteri della presente forma, come si vede evidente nell'esemplare di Ras Amas-Ras Tucul, 16. III. 1892 (n. 72).

var. **glomerata** A. Terracc. *Fl. Baja d'Anfilha*, p. 20.

Capitula 3-7 glomerata, subsessilia.

D a m o e i t a: Baia d'Anfilha: vulcani Haressan, 24. III. 1892 (T. n. 1179); Isola Assarka, 19. III. 1892 (T. n. 591).

A s s a o r t a: Colline intorno a Ras Ghedem, 7. III. 1892 (T. n. 46).

105. **Lactuca pseudoabyssinica** n. sp.

= *L. abyssinica* Schweinf. *Fl. Abyss. septentr. Col. Eritrea* (1892) n. 2054! (non Fresen).

Perennis, rhizomate brevi subligneo, verticali. Caulis erectus, herbaceus, cylindraceus, tenuis, apice, vel medio ramosus, glaberrimus, glaucus. Folia linearia-lanceolata minute denticulato-runcinata; radicalia in anthesi delapsa, caulina superiora linearia, tenuia, integerrima, omnia glauca, basi auriculata, auriculis triangularibus acutis, caulem amplectentibus, omnino glaberrima, margine in foliis inferioribus denticulis albidis carthilagineis, longitudinaliter costa media tenui eburnea. Capitula parva linearia in panicula sub dichotoma, pedicellis capitula aequantibus vel vix superantibus, tenuibus, glaberrimis. Involucrum duplex glaberrimum, bracteis exterius $\frac{1}{3}$ interioris aequantibus ovatis obtusis, in centro atroviridibus, marginibus albo-pellucidis: bracteae involucri interioris quinque lineares obtusae ad medium atrovirides,