

Species sat distincta, et clarissimo E. Engler, Musaei Berolinensis praefecto, grato animo dicata.

Hab.: isola Crulli (22, III).

XIX. SALVADORACEAE.

52. *Salvadora* Lam.

76. **S. persica** Linn. — Anders., *Fl. aden.*, p. 29.

Hab.: terra ferma, ad Haressan (23, III); — isole Crulli (22, III) ed Estam-Aghe (25, III).

XX. PLUMBAGINEAE.

53. *Statice* Lam.

77. **S. axillaris** Forsk. — Anders., op. cit., p. 29.

$\alpha)$ *genuina* A. Terr. — Vahl., *Symb.*, p. 26, t. 9.

$\beta)$ *attenuata* A. Terr.: foliis oblongo-spathulatis, strictioribus. Quam maxime medium inter speciem typicam et *S. axillare* Forsk. tenet.

Hab.: $\alpha)$ terra ferma, da Ras Madir ad Haressan e Ferehan (23-24, III); — isole Midir (22, III), Achil (24, III), Anto-Kebir (25, III), Crulli (22, III); — $\beta)$ terra ferma, a Ferehan (24, III); isola Achil (24, III), e qui è là col tipo.

79. **S. cylindrifolia** Forsk., *Descr. pl. fl. Aeg. Arab.*, p. 59. — Vahl., *Symb.*, p. 26, t. 10.

Hab.: isole Midir (22, III), Anto-Kebir (25, III) ed Allunto (23, III); — qui è là sulla costa di Haressan (24, III), ma rara.

78. **S. arabica** Jaub. et Spac. — Boiss., op. cit., IV, p. 868.

$\beta)$ *glomerata* A. Terr.: scapis axillaribus, ramosissimis, fastigiatis, dense florigeris, spiculis scorpioideis, lateralibus, floribus albis, minutis. Proxima praecedenti, uti Boissierius ipse affirmat.

Hab.: isola Estam-Aghe (25, III).

XXI. COMPOSITAE.

54. *Lactuca* Linn.

80. **L. goraeensis** Schultz. — Oliver, *Fl. trop. Afr.*, III, p. 452.

$\beta)$ *glomerata* A. Terr.: caule maiore, apice crebre ramoso, ramis rigidis, erectis, floribus maioribus secus ramulos glomeratis, glomerulis vix sexilibus.

Hab.: $\alpha)$ isola Midir (22, III); — $\beta)$ terra ferma, ad Haressan (23, III).

55. *Heterochaena* Fresen.

81. **H. massaviensis** Fresen. — Walpers, *Rep.*, VI, p. 360. — Oliver, op. cit., III, p. 455. — Anders., (sub *Brachyrampho lactucoide*) *Fl. Aden.*, p. 20.

Hab.: vulcani di Ferehan (24, III); — isola Midir (22, III).