

- ox. s. 7. t. 2. f. 9. L. Romana Gars. ic. t. 315. L. sativa Blackw. herb. t. 88. Heyne arzn. gew. 7. t. 30. Wall.! cat. comp. n. 354. (an spontanea?). L. sativa longifolia Lam. dict. 3. p. 403. Variat foliis atro-viridibus, plus minus fuscatis, seu fusco maculatis. Achænia nigrescentia. An ab hac satis differt L. bracteata Wall.! comp. n. 353 in Nepaliâ lecta? (v. v. c. et s. ex Indiâ.)
42. L. LONGIDENTATA (Moris! sp. sard. elench. 2. app.), glabra, caule erecto tereti striato apice confertè paniculato, foliis radicalibus lanceolato-spathulatis in petiolum attenuatis, caulinis basi auriculatis decurrentibus, omnibus glaucescentibus, laciniis lanceolatis acuminato-dentatis, pedicellis bracteolatis, invol. squamis lanceolatis elongatis acuminatis, achæniis striatis apice in colum achænio brevius productis. (I) in rupestribus calcareis Sardiniae orientalis. Flores flavi. (v. s. comm. à cl. Moris.)
43. L. DELTOIDEA, caule glabro erecto tereti simplici, foliis in petiolum basi semiamplexicaulem attenuatis runcinato-pinnatifiditis, lobis dentatis (summis magis confluentibus) subtus præsertim ad costam sparsè pilosis, paniculâ oblongâ, invol. cylindrico circ. 10-phyllo, squamis ext. duplò quam inter. brevioribus. — in Iberiâ mediâ (Bieb.), in sylvis montium Talusch versus pagam Drych (Mey!). Prenanthes deltoidea Bieb. fl. taur. suppl. p. 529. Mycelis ambigua Cass. dict. 48. p. 426. Lactuca deltoidea C. A. Mey! enum. n. 446. Flores lutei, in invol. 8-10. Achænum omnino Mycelidis. Variat foliis nunc angustè nunc latissimè dilatatis, auriculis integris dentatis. (v. s.)
44. L. HISPIDA, radice tuberosâ, caule fistuloso simplici pilis glandulosis hispido, foliis infer. runcinato-pinnatifidis dentatis lobo extimo triangulari, caulinis sinuatibus basi cordatis amplexicaulibus, paniculâ subcorymbosâ. — in sylvis Iberiæ australis versus fontes fl. Akstafa (Stev.), in Cappadociâ ad Euphratem (Aueb.! n. 3513). Prenanthes hispida Bieb. fl. taur. 2. p. 245 non Pall. Pren. tuberosa Stev. mem. soc. 4. p. 59. Pappus stipitatus unde huc potius quam Prenanthi pertinet. In specim. Aucheriano radix subrotunda Avellanæ nucis magnitud. Folia radic. longè petiolata ovato-lanceolata indi-visa. (v. s. comm. à cl. Auch.)
45. L. HASTATA, caule erecto tereti glabriusculo, foliis secùs petiolum et nervos subtus subpuberulis, petiolo nunc alato, nunc medio segmentis duabus ancto, nunc nudo, limbo cordato aut subhastato dentato, inferiorum obtuso, superiorum acuminato, paniculâ subracemosâ, capit. longè pedicellatis 20-22-floris, invol. squamis exterioribus circ. 6 dimidiò brevioribus lanceolatis, inter. circ. 12 linearibus. — in Nepaliâ legit cl. Wallich. Chondrilla hastata Wall.! cat. comp. n. 381. Affinis L. deltoidea, sed numero florarum magis adhuc Lactuca veræ affinis. Rostrum achænio dimidiò brevius. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. augl. Ind. or.)

### Sect. II. MYCELIS. — Mycelis Cass. dict. 33. p. 483.

Invol. cylindricum imâ basi minnitissimè calycinatum. Achæniis rostrum distinctum, achænio dimidiò triplò brevius.

46. L. GRACILIFLORA, glabra, caule erecto tereti fistuloso amplè et laxè paniculato, foliis petiolatis lyrato-pinnatifiditis, segmentis 1-3-jugis ovatis denticulatis, terminali majore acuminato, dentibus inaequalibus mucronatis, paniculâ amplissimâ laxâ, capitulis pedicellatis cylindricis 3-floris, invol. 3-phyllo minutè squamellato, achæniis compressis multistriatis breviter rostratis. — in Nepaliâ, ad Gossain-Than legit cl. Wallich. Prenanthes gracili-flora Wall.! cat. comp. 370. Herba circ. 2-pedalis. (v. s. comm. ab hon. coet. merc. angl. Ind. or.)

47. L. MURALIS, glabra, caule erecto tereti apice paniculato, foliis in petiolum alatum basi amplexicanlem attenuatis lyrato-pinnatifiditis dentatis membranaceis, lobo terminali majore angulato, capitulis laxè paniculatis cylindricis parcè calycinatis. (I) in Europæ nemoribus rupibus umbrosis et muris vetustis. Prenanthes muralis Linn. sp. 1121. fl. dan. t. 509. engl. hot. t. 457.