

- Schkuhr handb. t. 218. *Chondrilla muralis* Lam. dict. 2. p. 78. Gaertn. fr. 2. t. 158. *Mycelis angulosa* Cass. dict. 33. p. 484. *Mycelis muralis* Reichenb. fl. exc. p. 272. *Cicerbita muralis* Wallr. sched. 436. (v. s. et v.)
48. *L. ERSYMIFFOLIA*, glabra, caule erecto tereti apice paniculato, foliis in petiolum alatum basi amplexicaulem attenuatis lyrato-pinnatipartitis, terminali vix majore, superioribus amplexicaulis ovato-lanceolatis indivisis, capitulis laxè paniculatis cylindricis parè calyculatis. (1) ? in Ponto (Willd.), in Iberiâ subalpinâ ad fluvium Ksani (Bieb. Stev.!). *Prenanthes erysimifolia* Willd. sp. 3. p. 1543. Bieb. fl. taur. 2. p. 245. suppl. p. 529. *Chondrilla orient. maxima*, etc., Tourn. cor. 36. An var. *L. muralis* ex Stev. et Spr. sed præter notas indicatas invol. paulò brevius. (v. s.)
49. *L. GRACILIS*, glabra, caule erecto sulcato in parte inferiore folioso apice nudo dichotomo-paniculato, foliis lineari-lanceolatis utrinque acuminatis integerrimis 1-nerviis, paniculâ laxâ apice subcorymbosâ, capitulis 8-10-floris, invol. cylindricis minutè calyculatis. 2 in Nepaliâ et ad Panduah Ind. or. legit cl. Wallich. *Chondrilla gracilis* Wall. cat. comp. n. 377. Herba 1-1½ pedalis. Folia 3 poll. longa, 2 lin. lata. Capitula 3 lin. longa. Achæni rostrum breve. (v. s. comm. ab. hon. cur. merc. angl. Ind. or.)
50. *L. AURICULATA*, glabra aut infernè sparse pilosiuscula, caule erecto ramoso, foliis pinnatipartitis, lobis oblongis variè inciso-dentatis, radicalibus petiolatis multijugis obtusis, caulinis basi in auriculas duas productis, lobis magis acutis, paniculâ laxâ subcorymbosâ, pedicellis elongatis subnudis, capitulis cylindricis circ. 12-floris, invol. squamis 6-7 elongatis margine scariosis calyculo parvò cinctis, achæniis compressis striatis rostro achænio longiore gracili superatis. (1) in Nepaliâ legit cl. Wallich. *Chondrilla auriculata* Wall. cat. comp. n. 379. *Achænia fusca* rostro albo. (v. s. comm. ab. hon. cœt. merc. angl. Ind. or.)
51. *L. HEYNEANA*, caule erecto glabro tereti apice nudo, foliis subradicalibus rigidulis runcinatis grossè setoso-ciliatis cæterum glabris amplexicaulis, capitulis secus ramos distantibus subgeminis breviter pedicellatis cylindræcis, achæniis compressis striatis muriculatis breviter rostratis. (1) (2) frequens in ruderatis circâ Negapatam Ind. or. (Wight.) *Prenanthes sonchifolia* Willd. sp. 3. p. 1541. Heyn. in Wall. cat. n. 3286. comp. 376. *Lactuca ruicina* DC. in Wight contrib. p. 26. *Prenanthes racemosa* Roxb. fl. ind. 3. p. 405 non Michx. *Chondrilla racemosa* Poir. suppl. 2. p. 331. *Sonchus calyculatus* Roxb. ic. ined. ex Wight et Arn. Omnino differt à *Lact. sonchifolia* et à *Prenanthe runcinata* auct. *Achænia nigra* scabrida. Pappus albus mollissimus. (v. s. comm. ab. hon. cur. merc. angl. Ind. or. et in h. Wight.)
52. *L. LÆVIGATA*, glabra, caule erecto tereti simplici apice laxè corymboso, foliis lineari-lanceolatis subdenticulatis utrinque acuminatis, infer. petiolatis, summis sessilibus, capitulis 10-12-floris, invol. subcalyculati squamis 8 linearibus acutis, achænio striato in rostrum achænio brevius desinente. 2 in montosis Javæ occidentalis legit cl. Blume. *Prenanthes lævigata* Blume! bijdr. p. 836 non Wall. Herba vix pedalis. Folia infer. 6 pollic. (cum petiolo 2-poll.) longa, 6 lin. lata, sæpè integerrima. Capitula parva. (v. s. comm. à cl. Blume.)
- † *Species dubiæ.*
53. *L. ? CANADENSIS* (Linn. sp. 1119), caule erecto, foliis lanceolato-ensiformibus amplexicaulis dentatis, racemo composito terminali. 2 in sylvis et ad margines viarum Canadiæ et Novæ-Angliæ (Pursh.) *Sonchus pallidus* Willd. sp. 3. p. 1521. *Mulgedium integrifolium* Cass. dict. 33. p. 298? *Lact. Canadensis* altissima angustifolia flore pallidè sulphureo Tourn. iust. 174. †.
54. *L. FISTULOSA* (Rafin. fl. lud. p. 58), caule pedunculisque fistulosis, foliis sessilibus runcinatis glabris glaucis crassis. -- in Ludovicâ ad Atakapas. Capitula magna numerosa. †.