

Contributiones ad Floram Asiae Orientalis

(Continued from Vol. XXXIII, p. 129.)

by

Geniti Koidzumi, *Rigakuhakushi*

***Lactuca grandicolla* KOIDZ. nov. sp.**

L. linguaefoliae MAKINO affinis sed multo humilis, caudice brevi simplici nec ramoso, collo supernè fulvo-tomentoso; foliis rosulatis duplo triplove brevioribus, costis secundariis a costa media angulo acutissimo egressis rectis; capitulis vix majoribus, floribus luteis.

Suffruticosa collo epigaeo capitato 2.5–3.0 cm. longo 10–18 mm. crasso, vertice rosulifero molliter ferrugineo-tomentoso, infra collum caudice elongato lignoso obliquo vel erecto emittente. Cauliculi circ. 2–5, glabri 10–18 cm. alti. Folia radicalia rosulata crassa glabra subtus vix glauca oblango-oblancoolata vel spathulata, 5–6½ cm. longa, 2–2½ cm. lata, apice rotundata, basi cuneata, sessilia, margine integra vel crenato-repanda. Folia caulina ovata sessilia basi amplexicaulia, apice rotundata mucronulataque, glabra subtus vix glaucina, margine varie repanda, 1.5–3.0 cm. longa; folia suprema mucronulato-acutata. Capitula confertissime corymbosa, involucri cylindrico 5–6 mm. alto, 5-phylo basi squamoso, circ. 5-floro, floribus luteis. Corolla late ligulata 4 mm. longa 3 mm. lata apice 5-denticulata. Achenium oblongum 18–22 mm. longum fuscum circ. 10-costatum, infra discum parce constrictum, pappo uniseriale sordescens.

NOM. JAP. *Kohelanalen*.

DISTR. Bonin islands: insl. Chichishima.

***Evodia* (Lepta) *Nishimurae* KOIDZ. in Tok. Bot. Mag. XXXIII. p. (265).**

Species valde peculiaris, foliis trifoliolatis, foliolis coriaceis oblanceolato- vel spathulato-oblongis apice rotundatis basi cuneatis, coccis fulvo-tomentosis.

Arbor parva, rami purpureo- vel cinereo-fusci valde rugosi. Folia trifoliolata opposita, foliolis coriaceis glabris oblanceolato- vel subspathulato-oblongis apice rotundatis basi cuneatis, integerrimis, 4,5–