

- ox. s. 7. t. 2. f. 9. *L. Romana* Gars. ic. t. 315. *L. sativa* Blackw. herb. t. 88. Heyne arz. gew. 7. t. 30. Wall. cat. comp. n. 354. (an spontanea?). *L. sativa longifolia* Lam. dict. 3. p. 403. Variat foliis atro-viridibus, plus minus fuscatis, seu fusco maculatis. *Achænia nigrescentia*. An ab hæc satis differt *L. bracteata* Wall. comp. n. 353 in Nepaliâ lecta? (v. v. c. et s. ex Indiâ.)
42. *L. LONGIDENTATA* (Moris! sp. sard. elench. 2. app.), glabra, caule erecto tereti striato apice confertè paniculato, foliis radicalibus lanceolato-spatulatis in petiolum attenuatis, caulinis basi auriculatis decurrentibus, omnibus glaucescentibus, laciniis lanceolatis acuminato-dentatis, pedicellis bracteolatis, invol. squamis lanceolatis elongatis acuminatis, achæniis striatis apice in colium achænio brevius productis. (I) in rupestribus calcareis Sardinie orientalis. Flores flavi. (v. s. comm. à cl. Moris.)
43. *L. DELTOIDEA*, caule glabro erecto tereti simplici, foliis in petiolum basi semijamplexicaulem attenuatis runcinato-pinnatipartitis, lobis dentatis (summis magis confluentibus) subtus præsertim ad costam sparse pilosis, paniculâ oblongâ, invol. cylindrico circ. 10-phylo, squamis ext. duplè quàm inter. brevioribus. — in Iberiâ mediâ (Bieb.), in sylvis montium Talusch versùs pagum Drych (Mey!). *Prenanthes deltoidea* Bieb. fl. taur. suppl. p. 529. *Mycelis ambigua* Cass. dict. 48. p. 426. *Lactuca deltoidea* C. A. Mey. enum. n. 446. Flores lutei, in invol. 8-10. Achænium omninò *Mycelidis*. Variat foliis nunc angustè nunc latissimè dilatatis, auriculis integris dentatisve. (v. s.)
44. *L. HISPIDA*, radice tuberosâ, caule fistuloso simplici pilis glandulosis hispido, foliis infer. runcinato-pinnatifidis dentatis lobo extimo triangulari, caulinis sinuatis basi cordatis amplexicaulibus, paniculâ subcorymbosâ. — in sylvis Iberiæ australis versùs fontes fl. Akstafa (Stev.), in Cappadociâ ad Euphratem (Auch. n. 3513). *Prenanthes hispida* Bieb. fl. taur. 2. p. 245 non Pall. *Pren. tuberosa* Stev. mem. soc. 4. p. 59. Pappus stipitatus undè huc potius quàm *Prenanthi* pertinet. In specim. Außeriano radix subrotunda Avellanæ nucis magnitud. Folia radic. longè petiolata ovato-lanceolata indivisa. (v. s. comm. à cl. Auch.)
45. *L. HASTATA*, caule erecto tereti glabriusculo, foliis secùs petiolum et nervos subtus subpuberulis, petiolo nunc alato, nunc medio segmentis duabus aucto, nunc nudo, limbo cordato aut subhastato dentato, inferiorum obtuso, superiorum acuminato, paniculâ subracemosâ, capit. longè pedicellatis 20-22-floris, invol. squamis exterioribus circ. 6 dimidiò brevioribus lanceolatis, inter. circ. 12 linearibus. — in Nepaliâ legit cl. Wallich. *Chondrilla hastata* Wall. cat. comp. n. 381. Affinis *L. deltoideæ*, sed numero florum magis adhuc *Lactucæ* veræ affinis. Rostrum achænio dimidiò brevius. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)

Sect. II. MYCELIS. — *Mycelis* Cass. dict. 33. p. 483.

- Invol. cylindricum imâ basi minutissimè calyculatum. Achæni rostrum distinctum, achænio dimidiò triplòve brevius.
46. *L. GRACILIFLORA*, glabra, caule erecto tereti fistuloso amplè et laxè paniculato, foliis petiolatis lyrato-pinnatipartitis, segmentis 1-3-jugis ovatis denticulatis, terminali majore acuminato, dentibus inæqualibus mucronatis, paniculâ amplissimâ laxâ, capitulis pedicellatis cylindricis 3-floris, invol. 3-phylo minutè squamellato, achæniis compressis multistriatis breviter rostratis. — in Nepaliâ, ad Gossain-Than legit cl. Wallich. *Prenanthes graciliflora* Wall. cat. comp. 370. Herba circ. 2-pedalis. (v. s. comm. ab hon. cœt. merc. angl. Ind. or.)
47. *L. MURALIS*, glabra, caule erecto tereti apice paniculato, foliis in petiolum alatum basi amplexicaulem attenuatis lyrato-pinnatipartitis dentatis membranaceis, lobo terminali majore angulato, capitulis laxè paniculatis cylindricis parè calyculatis. (I) in Europæ nemoribus rupibus umbrosis et muris vetustis. *Prenanthes muralis* Lian. sp. 1121. fl. dan. t. 509. engl. bot. t. 457.