

Lactuca goracensis (Lam.) Schultz-Bip. in Flora 1842 p. 422; Oliver et Hiern l. c. 452. — *Sonchus goracensis* Lam. Enc. Méth. bot. III. 397 etc.

ABYSSINIEN, am Rande der Felder und an sterilen Orten von 1600—2300^m; Dscheladscheranne (Schi. III 1448); bei Anadehr um 2300^m (Schi. 1862 n. 585); Dschadscha um 1900^m (Schi. 1854 n. 268); Keren (St. 240); Habab um 1300—2000^m.

Auch auf den Inseln des Dalac-Archipels im rothen Meer (St.), in Kordofan, auf Sansibar, sowie in Senegambien.

Steppenpfl.

trop. Afr.

L. capensis Thnbn. Fl. cap. ed. Schultes p. 614; DC. Prodr. VII. 136; Harv. Fl. cap. III. 526; Oliv. et Hiern l. c. 452.

MASSAIHOCHLAND, Ngoro, um 1930^m (v. Höhnel 30 (120)).

KAMERUNGEBIRGE, um 1500—2450^m (G. Mann).

Auch in Senegambien und im Mosambikdistrict, desgl. in den südlichen und östlichen Districten des Caplandes.

Steppenpfl.

trop. Afr., Südafr.

L. abyssinica Fresen. in Mus. Senckenb. III. 72; Oliv. et Hiern l. c. 453.

ABYSSINIEN (Rüppell, Schimper nach Oliver und Hiern).

Auch in Sennaar, im Mittuland und im Lande der Njam-Njam.

Steppenpfl.

trop. Afr.

L. virosa L. Spec. pl. I. 795; Oliv. et Hiern l. c. 453.

ABYSSINIEN, um 2000^m (Schi.).

Auch in Kordofan, Ägypten, Nordindien, Europa.

Steppenpfl.

mediterr.-boreal.

L. Hochstetteri Schultz-Bip. in Schimp. pl. abyss. I. 128. — *Pyrrhopappus Hochstetteri* Rich. Fl. Abyss. I. 463.

ABYSSINIEN (Petit); auf dem Gipfel des Kubbi um 2600^m (Schi. I 128); im Hochthal von Ghaba in Simen (St. 422).

var. *humilis* (Schultz-Bip.) Oliv. et Hiern l. c. 454. — *Lactuca humilis* Schultz-Bip. in Schimp. pl. abyss. II. 1172. — *Pyrrhopappus humilis* Rich. in Fl. Abyss. I. c.

ABYSSINIEN; Udscherat (Dillon); Hochebene Talanta (Rohlf's); Beschilothal im Hochplateau der Gallas (St. 424, 435).

var. *Stuedneri* Schweinf.; capitulis majoribus.

ABYSSINIEN, auf Feldern bei Dschanda (St. 423).

Die Hauptform auch in Yemen (Deflers Voy. 160).

Bergwiesenpfl.

Arab., (Mediterr.)