

longis et 2 mm latis; floribus circ. 3, ligulatis, luteis, ligulis circ. 10 mm longis et 2 mm latis, 5-dentatis; antheris longe exsertis, circ. 6 mm longis, stylo exserto, lobis usque 2 mm longis; achaeniis circ. 4—4,5 mm longis, rostratis, rostro circ. 1 mm longo, compressis margine incrassatis et uninerviatis, breviter brunneo-tomentosis; setis albidis 5—6 mm longis, breviter ciliatis.

Katanga: Katentania, 1912 (Homblé, no. 695).

Obs. — Verwandt mit *L. Hockii*, aber mit kleineren Blüten.

258. **Lactuca Hockii** De Wild., nov. spec.

Ramis erectis, usque 35 cm altis, plus minus ramosis, striatis; foliis basilaribus linearibus plus minus amplexicaulibus, glabris, margine runcinatis, usque 9 cm longis et max. 5 mm latis, acutis; foliis ramorum et bracteis lanceolatis, acutis, basi non appendiculatis; capitulis terminalibus, subumbellatis, plus minus pedicellatis, pedicello bracteolato usque 8 cm longo, glabro; involuero 2,5—3 cm longo, pauciflori, squamis externis min. 3 mm longis, internis usque 2,7 cm longis, glabris, acutis, margine plus minus scariosis; floribus circ. 10—12; achaeniis rostratis, rostro elongato, gracili, compressis, margine crassis, uninerviatis, breviter brunneo-velutinis, usque 13 mm longis; pappus albidus circ. 11 mm longis; setis breviter setulosis.

Katanga: Plateau de la Manika, 1911 (Ad. Hock).

Obs. — Sehr auffallend durch die grossen Rezeptakeln.

CXXII. *Erlangea* (Compositaceae).

259. **Erlangea subcordata** De Wild., nov. spec.

Ramis erectis usque 1 m altis, radicis fibrillosis; ramis plus minus polygonalibus, juvenilis breviter velutino-griseis, demum glabris, apice plus minus ramosis; internodiis 5—11 cm longis, foliis oppositis, inferioribus plerumque 2 cm longis, ellipticis, subsessilibus, medianis ovatis, breviter petiolatis, petiolo usque 2—3 mm longo, lamina ovata, basi subcordata, apice plus minus longe cuneato-acuta, infra griseo-tomentosa, supra pilis brevibus basi albido-incrassatis munita et subscabra, usque 10 cm longa et 5 cm lata, margine denticulata, nervis lateralibus I utrinque circ. 8—9; capitulis 2—4 terminalibus, involuero campanulato, squamis pluriseriatis, circ. 4-seriatis; rubro-viridis, externis subfoliaceis, velutinis, lanceolatis, usque 6 mm longis, internis subcoriaceis, margine scariosis, extus et intus glabris sed margine ciliatis, circ. 6 mm longis et 2 mm latis, apice acutis; corolla tubulosa, purpurea, circ. 7 mm longa, tubo circ. 3,5 mm longo, limbo 5-lobato, lobis acutis circ. 2 mm longis, antheris non exsertis; setis 0 vel solitaribus, ciliatis; achaeniis plus minus polygonalibus, glabris vulgo 5-costatis, circ. 2,5—3 mm longis.

Katanga: Lualaba-Kraal, décembre 1912 (Homblé no. 926) et vallée de la Kapanda, décembre 1912 (Homblé, no. 1009).

Obs. — Verwandt mit *E. trifoliata* De Wild. et Muschl., aber mit gegenständigen und an der Basis herzförmigen Blättern.