

255. *Wedelia Ringoeti* De Wild., nov. spec.

Ramis erectis circ. 50 cm altis, ramosis, longitudinaliter striatis, velutino-scabris, foliis oppositis, plus minus longe petiolatis, petiolo usque 7 mm longo; lamina ovato-elliptica, basi rotundata vel late cuneata, apice longe cuneata subacuta; margine dentata revoluta supra et infra velutino-scabra, 3-nervia, nervis suprabasilaribus, usque 7,5 cm longa et 27 mm lata; floribus luteis axillaribus vel terminalibus, pedunculatis; capitulis solitariis heterogamos vel 0-ligulatis, squamis involucralibus pluriseriatis, externis min. 6 mm longis et 2 mm latis, velutino-scabris, margine ciliatis, basi plerumque violaceis, internis plus minus scariosis, apice plus minus pilosis, usque 9 mm longis et 3 mm latis, squamis disci glabris vel margine sparse ciliatis, apice violaceis; achaeniis griseo-velutinis, obovato-lanceolatis, circ. 5,5 mm longis et circ. 2 mm latis, obscure tetragonis, apice breviter setosis et 2-spinosis, spinis leviter ciliatis usque 2 mm longis.

Katanga: Shinsenda, mars 1912 (Ringoet, coll. Homblé, no. 530) vallée de Kapiri, février 1913 (Homblé, no. 1103).

Obs. — Verwandt mit *W. menotriche* Oliv. et Hiern, aus Mozambique

CXX. *Dicoma* (Compositaceae).256. *Dicoma Ringoeti* De Wild., nov. spec.

Ramis erectis ramosis, longitudinaliter striatis, polygonalibus, plus minus velutino scabris; foliis lanceolatis basi plus minus rotundatis et vaginantibus, apice cuneato-acutis, 2—8 cm longis et usque 8 mm latis, nervis lateralibus utrinque 2—3, supra et infra sparse velutinis et scabris, ciliatis; capitulis terminalibus usque 4 cm latis, squamis involucralibus numerosis, lanceolato-linearibus, 7—18 mm longis, acutis, extus dense velutino-sericeis, margine ciliatis, intus glabris, usque 1,5 mm latis; floribus violaceis circ. 10 mm longis, tubo circ. 5 mm longo, limbo 5-lobato, lobis lineari-acutis circ. 2 mm longis, margine ciliatis et apice pilosis; antheris non exsertis; achaeniis dense velutinis circ. 2—2,5 mm longis, setis pluriseriatis, externis brevis, internis circ. 10 mm longis breviter setulosis.

Katanga: Shinsenda, mars 1912 (Ringoet, coll. Homblé, no. 494).

Obs. — Verwandt mit *D. anomala* Sond., aber sehr gut verschieden durch die stark haarigen Brakteen.

CXXI. *Lactuca* (Compositaceae).257. *Lactuca Homblei* De Wild., nov. spec.

Ramis erectis ramosis usque 80 cm altis, sparse pilosis, striatis, foliis basilaribus . . . , foliis linearibus, basi plus minus amplexicaulibus non appendiculatis, apice cuneatis, margine plus minus dentatis, sparse pilosis, usque 6,5 cm longis et 6 mm latis, superioribus lanceolato-linearibus, acutis; floribus terminalibus paniculatis et usque 14—15 mm latis. Capitulis subsessilibus vel pedicellatis, pedicello usque 7 mm longo; involucre circ. 12 mm longo, squamis biseriatis, externis glabris 1,5—4 mm longis et usque 15 mm latis; internis circ. 3, usque 11 mm

longis et 2 mm latis; floribus circ. 3, ligulatis, luteis, ligulis circ. 10 mm longis et 2 mm latis, 5-dentatis; antheris longe exsertis, circ. 6 mm longis, stylo exserto, lobis usque 2 mm longis; achaeniis circ. 4—4,5 mm longis, rostratis, rostro circ. 1 mm longo, compressis margine incrassatis et uninerviatis, breviter brunneo-tomentosis; setis albidis 5—6 mm longis, breviter ciliatis.

Katanga: Katantania, 1912 (Homblé, no. 695).

Obs. — Verwandt mit *L. Hockii*, aber mit kleineren Blüten.

258. **Lactuca Hockii** De Wild., nov. spec.

Ramis erectis, usque 35 cm altis, plus minus ramosis, striatis; foliis basilaribus linearibus plus minus amplexicaulibus, glabris, margine runcinatis, usque 9 cm longis et max. 5 mm latis, acutis; foliis ramorum et bracteis lanceolatis, acutis, basi non appendiculatis; capitulis terminalibus, subumbellatis, plus minus pedicellatis, pedicello bracteolato usque 8 cm longo, glabro; involuero 2,5—3 cm longo, pauciflori, squamis externis min. 3 mm longis, internis usque 2,7 cm longis, glabris, acutis, margine plus minus scariosis; floribus circ. 10—12; achaeniis rostratis, rostro elongato, gracili, compressis, margine crassis, uninerviatis, breviter brunneo-velutinis, usque 13 mm longis; pappus albidus circ. 11 mm longis; setis breviter setulosis.

Katanga: Plateau de la Manika, 1911 (Ad. Hock).

Obs. — Sehr auffallend durch die grossen Rezeptakeln.

CXXII. *Erlangea* (Compositaceae).

259. **Erlangea subcordata** De Wild., nov. spec.

Ramis erectis usque 1 m altis, radicis fibrillosis; ramis plus minus polygonalibus, juvenilis breviter velutino-griseis, demum glabris, apice plus minus ramosis; internodiis 5—11 cm longis, foliis oppositis, inferioribus plerumque 2 cm longis, ellipticis, subsessilibus, medianis ovatis, breviter petiolatis, petiolo usque 2—3 mm longo, lamina ovata, basi subcordata, apice plus minus longe cuneato-acuta, infra griseo-tomentosa, supra pilis brevibus basi albido-incrassatis munita et subscabra, usque 10 cm longa et 5 cm lata, margine denticulata, nervis lateralibus I utrinque circ. 8—9; capitulis 2—4 terminalibus, involuero campanulato, squamis pluriseriatis, circ. 4-seriatis; rubro-viridis, externis subfoliaceis, velutinis, lanceolatis, usque 6 mm longis, internis subcoriaceis, margine scariosis, extus et intus glabris sed margine ciliatis, circ. 6 mm longis et 2 mm latis, apice acutis; corolla tubulosa, purpurea, circ. 7 mm longa, tubo circ. 3,5 mm longo, limbo 5-lobato, lobis acutis circ. 2 mm longis, antheris non exsertis; setis 0 vel solitaribus, ciliatis; achaeniis plus minus polygonalibus, glabris vulgo 5-costatis, circ. 2,5—3 mm longis.

Katanga: Lualaba-Kraal, décembre 1912 (Homblé no. 926) et vallée de la Kapanda, décembre 1912 (Homblé, no. 1009).

Obs. — Verwandt mit *E. trifoliata* De Wild. et Muschl., aber mit gegenständigen und an der Basis herzförmigen Blättern.