

*Folia ovata, petiolata, integerrima,
Racemi compositi.*

Petala interne hirsuta, ut in Lasiantho.

*Nectarii glandulæ 5, ovatae, longitudine germinis,
altervantes cum staminum phalangibus.*

*Filamenta quinque, apice in penicillum divisa. Anthe-
rae globosæ. Fructus non dum virius.*

Obs. Convenit petalis interne hirsutis cum Lasiantho.

XIX. SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

hirsuta. SCORZONERA foliis linearibus cauleque unifloro hir-
sutis.

Tragopogon calycibus corolla brevioribus, foliis inte-
gris strictis ciliatis, caule hirto, pedunculis superne
incrassatis. Gerard. prov. 257.

Tragopogon hirsutum. Baub. pin. 274.

Tragopogon alter luteus. Col. ephr. 1. p. 234. t.
233.

Habitat in Apulia.

H. U.

Folia canaliculata.

Semina hirsuta, alba papposa.

indica. LACTUCA foliis lanceolato-ensiformibus sessilibus in-
æqualiter dentatis.

Habitat in Java. Osbeck.

Lactuca canadensis habet maximam cum hac similitu-
dinem: convenit Statura angusta, alta; Seminibus
brevisime stipitatis

Indicæ Folia magis dentata: dentibus inæqualibus ma-
joribus minoribusque; Foliis insuper vix petiolatis,
minime amplexicaulibus. Panicula magis ramosa
magisque florifera.

nudicaulis. CHONDRILLA scapo nudo, floribus paniculatis.

Chondrilla lactucacea foro julienis. Raj. hist. 228. an?

*Habitat in America septentrionali; ad pyramides æ-
gypti.*

H. U.

*Folia radicalia, runcinata, extremitate obtusa, levia,
denticulato-ciliata.*

*Scapi pauci, pedales, paniculati, recti, teretes, lœves,
foliolo uno alterove minuto.*