

subincurvis flavis striatis transversè rugoso-scabris in rostrum brevissimum attenuatis, pappi nivei achænio vix longioris caducissimi setis omnibus plumosis basi inter se coalitis.

Hab. in herbidis regionis alpinæ *Olympi Bithyni* ubi Aug. 1842 legi.

Planta faciei *Oporiniæ autumnalis*. Folia 2-3 pollicaria eis *L. hastilis* similia, caules tortuosi a basi ramosi nudi cum pedunculis vix semipedales, capitula eis *P. hieracioidis* paulò minora. Species ab omnibus biennibus aut perennibus generis caulibus pumilis tortuosis ascendentibus involucrique adpresso nigricanti distincta.

**LACTUCA INTRIGATA** Boiss. (Sect. *Scariola* DC.)

*L.* perennis humilis dumosa basi suffrutescens, caulibus numerosis a basi dichotomè ramosissimis intricatis parcè puberulis glabrisve glauco-cæsiis, foliis radicalibus petiolo dilatato suffultis caulinisque inferioribus angustè lineari-lanceolatis in lacinias lineares abbreviatas runcinato-pinnatisectis subtùs secùs nervum medium crispo-lanatis, foliis superioribus linearibus denticulatis basi acutè auriculatis, supremis secùs ramulos et ad eorum basin minimis squamæformibus ovato-cordatis, capitulis brevissimè pedicellatis paucifloris, involucri glaberrimi foliolis cæsiis angustè albo-marginatis adpressis inferioribus brevioribus acutis subacuminatis cæteris obtusiusculis, achæniis..... rostro eis subæquilongo superatis, pappi sordidi albi setis sub lente valido scabridis.

Hab. in siccis regionis alpinæ superioris *Cadmi* occidentalis suprâ *Gheyra* et *Tmoli* orientalis occidentalisque. Legi Jun. 1842.

Caules a basi ramosissimi dichotomi dumos intricatissimos subspinescentes vix pedem dimidium altos formantes, folia inferiora bipollicaria in lacinias runcinatas angustè lineares valdè longitudine variantes dissecta. Capitula parva pauciflora subcylindrica 4-5 lineas longa. Infausto casu nec colorem florum jam emarcidorum nec formam achæniorum in speciminibus meis fructiferis abortivorum videre potui. Species distinctissima propè *Lact. tenerrimam* et affines collocanda habitu mirè *Zollikoferiam chondrilloidem* referens sed minor, magis

depressa intricatave et ab eâ insuper capitulis triplò minoribus, achæniisque rostro filiformi superatis nec erostratis diversissima.

### CEPHALORRHYNCHUS Boiss.

Capitulum pluriflorum. Involucrum cylindricum biseriale serie externâ triplò breviori calyculiformi. Receptaculum nudum. Achænia vix compressa sub lente striata minutèque tuberculata rostro eis breviori filiformi apice capitato-incrassato superata. Pappus piliformis scaber albus uniserialis. Setæ in discum basi coalitæ suprâ eum demùm ruptæ fugacissimæ et rostrum disco breviter fimbriato superatum persistens reliquentes.

### CEPHALORRHYNCHUS GLANDULOSUS Boiss.

Planta annua specimina majora *Crepidis pulchræ* mirè referens. Caulis 1-2 pedalis foliosus ramosissimus acutè striatus fistulosus, rami pedunculique pilis patulis rigidis apice glandulosis asperi. Folia infima quorum reliquias jam exsiccatas tantùm vidi in petiolum attenuata, caulina media et superiora e basi latiori sessili auriculato-cordatâ oblongo-lanceolata subrepanda acuta, majora tripollicaria ferè pollicem lata, suprema minora lanceolata acuminata omnia subrepando-dentata vel integra glabrescentia. Capitula in corymbos laxos compositos terminales disposita pedunculis eis æqualibus basi bracteâ subulatâ suffultis insidentia. Involucri glabri phylla lanceolato-lineararia viridia seriei exterioris 5-6 ferè triplò minora, interioris 8na 5 lineas longa lineæ  $\frac{3}{4}$  lata angustè albo-marginata attenuata apice obtusiuscula nigricantia sub lente ciliatula achæniis deciduis demùm reflexa. Flores non vidi. Achænia in capitulo 7-8 nigrescentia teretia angulato-striata subincurva infernè subangustata glabra minutè tuberculis in parte superiori achenii sub lente aculeolatis obsita ferè 2 lineas longa, attenuata in rostrum viride filiforme lineæ  $\frac{3}{4}$  longum cum achænio veluti articulatum facilèque ab eo solubile apice incrassatum in corpusculum pyriformi-hemisphæricum supernè planum centro umbonatum e pappi setis basi coalitis ortum. Setæ te-