

Inula salicina L. var. *latifolia* FR. et SAV. (non DC.), l. c.

Caulis etiam usque ad apicem semper dense pilosus.

Nom. Jap. KASENSŌ.

Typus. Hondo: Prov. Kai: Yamura (10 Jul. 1931 S. KITAMURA in Herb. Univ. Imp. Kioto.).

Distr. Hokkaido, Hondo, Shikoku, Kiusiu, et Korea.

Lactuca lanceolata MAKINO in Tokyo Bot. Mag. XXVII (1913) p.

257.

var. **batakanensis** KITAMURA var. nov.

Lactuca batakanensis KITAMURA in Shed. Herb. Univ. Imp. Kioto.

A typicam foliis semper irregulariter pinnatifidis, lobis remote dispositis distinguenda.

Radix crassa lignosa apice 7 mm. in diametro, fusiformis inter rupi profunde penetrat. Caulis primarius brevissimus foliis copiose rosullatis instructus, caulis florifer semper infra rosulam radiatim procumbens, supra medium erectus, pars procumbens circ. 10-5 cm. longa, pars erecta 17-12 cm. alta basi foliis rosullatis suffulta. Folia rosulae caulis primariis spatulata 7-6 cm. longa 1.5 cm. lata apice rotundata irregulariter pinnatifida 4-3 juga, laciniis rotundatis remote disposita, utrinque glabra, textura crassiuscula. Folia caulina spatulata irregulariter lobata vel subintegra apice obtusa, inferiora petiolata superiora sessilia/amplexicaulia. Inflorescentia corymbosa polycephala. Capitula pedicellata, pedicellis post anthesin circ. 15 cm. longis gracilibus. Involucrum tubulosum 8 mm. longum 6 mm. latum in sicco. Squamae 2 seriales, exteriores calyculatae 2 mm. longae, interiores linear-lanceolatae 8 mm. longae. Corolla flava liguliformis 1 cm. longa, pars tubi 2 mm. longa angusta, pars ligula 8 mm. longa 3 mm. lata apice 5-fida nervis 6 percusa. Achenium 4 mm. longum nigrescens subteres 10 striatum minutissime scaberulum basi contractum apice in rostrum brevem leviter contractum. Pappus albescens scaberulus.

Nom. Jap. BATAKAN-AZETONA nov.

Typus. Formosa: Prov. Karenko: inter Batakan et Tabito (16 Mar. 1932 M. TATEWAKI et S. KITAMURA in Herb. Univ. Imp. Kioto.).

Picris kaimaensis KITAMURA sp. nov.

A *Picre kamtschatica* caulibus longioribus capitulis minoribus et sparce setosis bene distinguenda, *Picri japonicae* affinis sed involucrum nigrescens, corolla intense flava.

Caulis circ. 65 cm. altus sulcato-striatus ramosus ad basim dense et sursum pedetemtim sparce setosus, setis 2.5-2 mm. longis sordidis apice bifurcatis basi sensim incrassatis. Folia radicalia sub anthesin emarcida