

- ox. s. 7. t. 2. f. 9. L. Romana Gars. ic. t. 315. L. sativa Blackw. herb. t. 88. Heyne arzn. gew. 7. t. 30. Wall.! cat. comp. n. 354. (an spontanea?). L. sativa longifolia Lam. dict. 3. p. 403. Variat foliis atro-viridibus, plus minùs fuscatis, seu fusco maculatis. Achænia nigrescentia. An ab hac satis differt L. bracteata Wall.! comp. n. 353 in Nepaliâ lecta? (v. v. c. et s. ex Indiâ.)
42. L. LONGIDENTATA (Moris! sp. sard. elench. 2. app.), glabra, caule erecto tereti striato apice confertè paniculato, foliis radicalibus lanceolato-spathulatis in petiolum attenuatis, caulinis basi auriculatis decurrentibus, omnibus glaucescentibus, laciniis lanceolatis acuminato-dentatis, pedicellis bracteolatis, invol. squamis lanceolatis elongatis acuminatis, achæniis striatis apice in colulum achænio brevis productis. ① in rupestribus calcareis Sardinie orientalis. Flores flavi. (v. s. comm. à cl. Moris.)
43. L. DELTOIDEA, caule glabro erecto tereti simplici, foliis in petiolum basi semiamplexicaulem attenuatis runcinato-pinnatipartitis, lobis dentatis (summis magis confluentibus) subtùs præsertim ad costam sparse pilosis, paniculâ oblongâ, invol. cylindrico circ. 10-phylo, squamis ext. duplò quàm inter. brevioribus. — in Iberiâ mediâ (Bieb.), in sylvis montium Talüscher versùs pagum Drych (Mey.!). Prenanthes deltoidea Bieb. fl. taur. suppl. p. 529. Mycelis ambigua Cass. dict. 48. p. 426. Lactuca deltoidea C. A. Mey.! enum. n. 446. Flores lutei, in invol. 8-10. Achænium omninò Mycelidis. Variat foliis nunc angustè nunc latissimè dilatatis, auriculis integris dentatisve. (v. s.)
44. L. HISPIDA, radice tuberosâ, caule fistuloso simplici pilis glandulosis hispido, foliis infer. runcinato-pinnatifidis dentatis lobo extimo triangulari, caulinis sinuatis basi cordatis amplexicaulibus, paniculâ subcorymbosâ. — in sylvis Iberiæ australis versùs fontes fl. Akstafa (Stev.), in Cappadociâ ad Euphratem (Auch.! n. 3513). Prenanthes hispida Bieb. fl. taur. 2. p. 245 non Pall. Pren. tuberosa Stev. mem. soc. 4. p. 59. Pappus stipitatus undè huc potiùs quàm Prenanthes pertinet. In specim. Aucheriano radix subrotunda Avellanæ nucis magnitud. Folia radic. longè petiolata ovato-lanceolata indivisa. (v. s. comm. à cl. Auch.)
45. L. HASTATA, caule erecto tereti glabriusculo, foliis secùs petiolum et nervos subtùs subpuberulis, petiolo nunc alato, nunc medio segmentis duabus aucto, nunc nudo, limbo cordato aut subhastato dentato, inferiorum obtuso, superiorum acuminato, paniculâ subracemosâ, capit. longè pedicellatis 20-22-floris, invol. squamis exterioribus circ. 6 dimidiò brevioribus lanceolatis, inter. circ. 12 linearibus. — in Nepaliâ legit cl. Wallich. Chondrilla hastata Wall.! cat. comp. n. 381. Affinis L. deltoideæ, sed numero florum magis adhuc Lactucæ veræ affinis. Rostrum achænio dimidiò brevis. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)

Sect. II. MYCELIS. — Mycelis Cass. dict. 33. p. 483.

Invol. cylindricum imâ basi minutissimè calyculatum. Achæni rostrum distinctum, achænio dimidiò triplòve brevis.

46. L. GRACILIFLORA, glabra, caule erecto tereti fistuloso amplè et laxè paniculato, foliis petiolatis lyrato-pinnatipartitis, segmentis 1-3-jugis ovatis denticulatis, terminali majore acuminato, dentibus inæqualibus mucronatis, paniculâ amplissimâ laxâ, capitulis pedicellatis cylindricis 3-floris, invol. 3-phylo minutè squamellato, achæniis compressis multistriatis breviter rostratis. — in Nepaliâ, ad Gossain-Than legit cl. Wallich. Prenanthes graciliflora Wall.! cat. comp. 370. Herba circ. 2-pedalis. (v. s. comm. ab hon. coet. merc. angl. Ind. or.)
47. L. MURALIS, glabra, caule erecto tereti apice paniculato, foliis in petiolum alatum basi amplexicaulem attenuatis lyrato-pinnatipartitis dentatis membranaceis, lobo terminali majore angulato, capitulis laxè paniculatis cylindricis parcè calyculatis. ① in Europæ nemoribus rupibus umbrosis et muris vetustis. Prenanthes muralis Linn. sp. 1121. fl. dan. t. 509. engl. bot. t. 457.