

spongiosum contracta, multicostata, costis 4-5 crassioribus, intermediis tenuibus; pappus basi in anulum persistentem concretus, setis sordide albis, fragillimis, involucrium ad maturitatem vix superantibus.

Hab. — Yunnan, glaciers de Likiang, alt. 4000 m. (Delavay, n. 2460).

Bien caractérisé, dans la section *Glomeratæ*, par ses involucries formés de 10-12 folioles bisériées; par ses capitules assez gros, longuement pédonculés; par ses achaines surmontés d'un disque épais, spongieux, qui porte l'aigrette.

C. trichocarpa.

(*Glomeratæ*.) — Rhizoma gracile, elongatum, squamiferum; caulis epigæus brevis, apice late dilatatus, cavus, foliatus, foliis omnibus perfecte evolutis, longe petiolatis, petiolo alato; limbus crassus, glaucus, oblongus vel lanceolato-oblongus, runcinatus, lobis sinu lato disjunctis, triangularibus, apice mucronatis, margine brevissime ciliolatis, nervo medio crasso, secundariis inconspicuis; capitula permulta, dense congesta, pedunculis 1-2 cent. longis, glabris, paucibracteis; involucri phylla 5, lanceolato-oblonga, obtusa, 15-18 mill. longa, glabra vel setis raris conspersa, late albo marginata; ligulæ luteæ, tubo filiformi; achænia (haud matura) lutea, columnaria, multi-striata, crebre pilosula, apice distincte attenuata, in discum tenuem, annularem abeuntia; pappus rufescens, vel sordide albidus, nunc prima ætate æneus, setis vix in anulum concretis, facile secedentibus, fragillimis.

Hab. — Su-tchuen: circa Ta-tsien-lou; in pascuis siccis prope Tongolo, ad Dara-tha-pong; in collo Tche-to-chan (R. P. Faurie).

Plus robuste que le *C. Hookeriana*; il est surtout caractérisé par ses achaines pubescents, particularité qu'on n'observe pas dans les autres espèces de la section.

Lactuca Souliei.

(*Aggregatæ* sect. nov.) — Caulis subnullus, apice dilatatus cavus; capitula angusta, sessilia, dense congesta.

Cette section se comporte, parmi les *Lactuca*, comme la section *Glomeratæ* parmi les *Crepis*.

nigro-violaceis; achæmium (juvenile) apice truncatum; pappus niveus, setis fragilibus.

Hab. — Su-tchuen oriental, montagnes du district de Tchen-kéou-tin (R. P. Farges).

Les feuilles ressemblent à celles du *L. sororia*, mais les achaines tronqués au sommet rapprochent le *L. melanantha* des *L. (Prenanthes) Khasiana* Clarke et *L. (Prenanthes) Brunoniana* Wall.; il diffère de l'un et de l'autre par ses capitules violacés ou noirâtres, les fines glandes très serrées qui recouvrent la partie supérieure de la tige, les rameaux de l'inflorescence et les pédoncules; par les feuilles qui ne sont point segmentées dans le même type.

Le *L. Khasiana* a d'ailleurs été observé aussi en Chine par le R. P. Delavay, qui l'a récolté à Tchen-fong-chan, en société du *L. Brunoniana*, ce dernier, sous sa forme à feuilles lyrées (*Prenanthes raphanifolia* DC., *Prodr.*, VII, 195) et en même temps très hispides, dont les lobes latéraux sont atténués à la base, comme pédicellés.

L. napifera.

(*Prenanthesia*). — Radix incrassata, napiformis; caulis 2-3 pedalis, striato-sulcatus, virgatus, simplex, basi asperatus, superne levis fere, nudus; folia omnia basilaria, crassiuscula, pallide virentia, breviter petiolata, utraque facie petioloque pilis strigosis præsertim ad nervos hispida, e basi attenuata ovata vel oblonga, breviter acuta vel obtusa, præsertim inferne grosse et inæqualiter dentata vel sinuata, obscure callosodenticulata, limbo 10-15 cent. longo; folia caulina 1-3, squamiformia vel minima, 1-2 cent. longa, pectinata vel subulata; racemus angustissimus, 15-20 cent. longus, 2-3 cent. latus, capitulis 3-5 ad ramulos brevissimos congestis; pedunculi capitulis breviores; capitula 1 cent. longa, cylindræa, vix 2 mill. lata; involucri phylla pallide viridia, glabra, interiora 4-5 oblonga, obtusa, æqualia, exterioribus paucis, multo brevioribus; ligulæ 4-5, luteæ; achænia leviter compressa, 10-costata, oblonga, apice truncata; pappus sordide albus, achænio vix longior.

Hab. — Yunnan, dans les bois de Pins au-dessus de Ta-pin-tze (Dalavay, n. 574 et 3674).

C'est un nouvel exemple d'une forme propre à l'Amérique du Nord et se retrouvant dans l'Asie centrale. Le *L. napifera* n'a de rapports, en effet, qu'avec le *Prenanthes virgata* Mich. (*Nabalus virgatus*

DC.), et c'est le seul *Lactuca* asiatique qui soit dans ce cas ; on peut d'ailleurs facilement se rendre compte des différences qui séparent les deux espèces.

Aux espèces précédemment citées appartenant à la section *Prenanthesia*, il faut ajouter les suivantes :

Lactuca Tatarinowii (*Prenanthes Tatarinowii* Maxim.). — Chine septentrionale, Pékin, Jéhol ; Chine occidentale, Su-tchuen oriental (R. P. Farges) et province de Hupeh (D^r Henri). — Varie à inflorescence très ample ou appauvrie, formant une panicule étroite, à feuilles toutes entières, ou bien les moyennes et les inférieures lyrées ; les pétioles sont tantôt complètement glabres, tantôt poilus, un peu glanduleux ; les achaines toujours anguleux, nettement cylindriques, tronqués au sommet.

L. Hemsleyi (*Prenanthes Faberii* Hemsl. — Su-tchuen, mont Omei (Faber).

L. ochroleuca (*Nabalus ochroleucus* Maxim. ; *Prenanthes ochroleuca* Hemsl.). — Corée (Carles).

SECT. *Faberia* Hemsley (*genus propr.*). — *Achænia angusta*, vix compressa, multicostata, apice parum et brevissime attenuata, pappo sordido ; capitula multiflora, ovato-oblonga ; involucri phylla angusta ab extimis ad intima sensim longiora ; caulis subnudus, foliis basilaribus sinuato-lyratis vel angulatis. — Inflorescentia racemoso-corymbosa.

Diffère de la section *Sororiæ* par ses capitules multiflores, plus gros et par ses tiges presque dépourvues de feuilles. C'est un intermédiaire entre les *Lactuca* et les *Crepis* et qui pourrait, peut-être avec autant de raison, être rapporté à ce dernier genre à cause de ses achaines. Le caractère de la forme des feuilles le rapproche plus cependant des *Lactuca* que de tout autre genre.

L. thibetica.

(*Faberia*). — Partibus omnibus glabra ; radix gracilis ; caulis 25-35 cent., erectus, simplex, gracilis, oligophyllus foliis caulinis 1-2, nunc ad bracteam linearem adductis ; folia basilaria et inferiora longe et graciliter petiolata, limbo quam petiolus 2-3-plo brevior, glauco, papyraceo, 3-4 cent. longo, e basi sæpius inæqualiter cordata deltoideo-ovato, inciso-angulato, lobis paucis parce dentatis, in acumen integrum desinenti ; capitula pauca (1-4) racemosa, longe pedunculata, pedunculis basi nudis vel bractea minuta stipatis, multiflora ; involucri ovati phylla