

tis ; interioribus 1-2 subtetragonis ; pappi albidi setis vix denticulatis.

Crescit ad rupes in valle *Maye-Oui*, provinciæ *Médat*, mense Aprili et in rupibus montium versus fluvium *Taccazé*, mense Septembre florens (Rüppel, Schimper).

*Observation.* — Espèce à fleurs violacées, à capitules très-grêles, remarquable par ses feuilles largement embrassantes et cordiformes à leur base, pinnatifides et à lobes allongés et très-finement denticulés.

LACTUCA PARADOXA. C. H. Schultz, in *pl. Schimp. Abyss.*, sect II, n° 4320.

*L.* caule diffuse ramoso, tereti, glabro, ramis divaricatis, gracilibus ; foliis caulinis sublyratis, lobo terminali, multo majori oblongo-acuto, subcordato, emarginato, dentato, basi abrupte angustato et longe petiolato, lobis lateralibus binis suboppositis elliptico-oblongis, basi quasi petiolatis acutis, margine subemarginato-denticulatis, utrinque glabris glaucisque ; foliis supremis integris, simplicibus lanceolatis ; capitulis gracilibus teretibus ; involucri squamis purpurascensibus, lanceolatis subobtusis glabris, guttato-succosis ; akeniis subteretibus, parte superiore sensim attenuatis, apice dilatato-depressis, pappi setis albidis, denticulatis.

Crescit in dumetis et sylvaticis lateris borealis montis *Taber*, in provincia *Semiène*, mense Aprili florens (Schimper).

*Observation.* — Cette espèce a un port tout particulier, ses rameaux sont écartés, divariqués, ses capitules grêles, ayant leurs écailles couvertes de gouttelettes de suc propre condensé, ses akènes sont grêles, allongés, atténués à leur partie supérieure, qui s'élargit circulairement pour porter les poils de l'aigrette.

LACTUCA RARIFLORA. Fresen, in *Mus. Senckenb.*, III, 73.

*L.* caule glabro dichotomo, ramoso, foliis runcinatis denticulatis indivisisque linearibus, parte terminali elongata lineari acuminata, subtus in nervo pilosis, superioribus lanceolato-linearibus sagittato-amplexicaulibus, auriculis elongatis lanceolato-linearibus acuminatis, capitulis pedunculatis remotis, in panicula dichotoma cymæformi, pedunculis bracteolatis, akeniis oblongis utrinque striatis, rostro tertiam vel quartam partem akenii æquante, pappo flavescens apice albo.