

Folia prima s. radicalia in a. integra, in d. sinuata.
Raj. angl. 3. p. 161.

- canadensis.* 4. LACTUCA foliis lanceolato-ensiformibus dentatis
 inermibus.

*Lactuca canadensis altissima angustifolia, flore pallide
 luteo. Tournef. inst. 474.*

*Sonchus sylvestris, folio laciniato glauco; costa non spi-
 nosa. Raj. suppl. 137.*

Habitat in Canada. Kalm.

*Differit a sativa caule altiore; Folii quadruplo longi-
 ribus, angustioribusque; Racemo terminali longo,
 composto, nec corymboso.*

- faligna.* 5. LACTUCA foliis hastato-linearibus sessilibus carnis
 aculeatis. *Amer. acad. 1. p. 150.*

*Lactuca foliis linearibus hastatis: inferioribus dentatis.
 Roy. Ingld. 121.*

*Lactuca foliis imis pinnatifidis, ceteris ensiformibus ba-
 si hastatis, dorso ferratis. Sauv. monsp. 692.*

*Lactuca foliis radicalibus linearibus dentato pinnatis: la-
 ciniis sursum dentatis: caulinis alato-lanceolatis, flo-
 ralibus linearibus sessilibus. Gmel. stamp. 374. Dalib.
 paris. 236.*

*Lactuca sylvestris altissima, foliis inferioribus dentatis
 superioribus acuminatis integris. Raj. suppl. 135.*

*Lactuca sylvestris altera, angusto-faligno folio: costa
 albicante. Kapp. jen. 167. Hall. jen. 207. t. 4. optim.*

*Lactuca sylvestris, angusto-laciniato folio. Magn. monsp.
 298.*

Endivita minor lactucina spinosa. Barr. ic. 136.

Habitat in Gallia, Lipsiae.

- perennis.* 6. LACTUCA foliis linearibus dentato-pinnatis: laciniis
 sursum dentatis. *Hort. cliff. 384. Roy. Ingld. 111.
 Dalib. paris. 236.*

*Chondrilla cærulea altera, cichorii sylvestris folio. Babb.
 pin. 130.*

Chondrilla. Dod. pent. 637.

Apate. Dalecb. hist. 561.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia. 2

CHONDRILLA.

- canaria.* 1. CHONDRILLA. † *Hort. cliff. 383. Roy. Ingld.
 110. Hall. helv. 755. Gmel. fabir. 2. p. 8.*
Chou