

p. 521. *Spec. Plant.* p. 798. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 593.

Ft. Carniol. p. 387.

Taraxacum calycibus glabris; squamis imis reflexis.

HALL. *Hist.* n. 56.

DIAGN. *Calyces squamae exteriores et imae reflexae.*

Habitat ubique in pratis.

Quis vidit in hac planta pappum pulmosum?

958. HEDYPNOIS *Paludosa*. Tab. 48.

DIAGN. *Folia lanceolata, laxe dentata. Semiflosculi tridentati. Pappi stipes tres lineas longus.*

Habitat in pratis humidis, et subsylvestribus, circa Idriam.

Radix perennis. Folia semipedalia et breviora, digiti latitudine, glaberrima, quatuor sinubus obsoletis utrinque exscissa, cum totidem dentibus interpositis. Apex folii est conus acutus, cuius basis fere duplo brevior lineis lateralibus. Scapi plures e gemmis totidem diphyllis, modice lanuginosi, attenuati, fistulosi, uniflori, foliis subaequales. Calycinarum squamarum ordo primus erectus, fusco viridis, squamas continet (ad 12), ovato-lanceolatas. Ordo alter constat squamis (ad 14), pariter erectis, angustioribus, longioribusque. Semen compressum, lanceolatum; facie qualibet quinque lineis elevatis et apice denticulatis, striata.

315. LACTUCA.

PLIN. TOURN. *I. R. H.* p. 473. Tab. 267.

LINN. LUDWIG. HALL.

Calyx imbricatus, squamis erectis multorum ordinum. Semina striata; striis quibusdam aut omnibus ad apicem scabris, pappo simplici et stipitato instructa, utrinque acuminata. TOURN. *I. c. I.* LUDWIG.

959. LACTUCA *Prenanthoides*. Tab. 49.

DIAGN.

DIAGN. *Folia radicalia lanceolata, acuminata, sub apice rariter dentata. Caules ramosi, subnudi; ramis summis corymbosis.*

Habitat in siccissimis et fabulosis montibus Carnioliae superioris.

Radix perennis fusca, descendens, fibrofa, crassiuscula. Folia radicalia unciam circiter longa, tres lineas lata, duriuscula, glabra; integerrima et sub apice uno aliove dente instructa. Caules vix semipedales, firmi, teretiusculi, lineam crassi, glabri, ramosi. Rami supremos pedunculos umbellatos gerunt, unciales et breviores, squamulis setaceis, exiguis adspersos. Calyx lineas quatuor longus, unam latus, cylindraceus, glaber, fuscescens, constat squamis octo longioribus, aliisque quatuor minoribus ad basin positis, inaequilibus. Semiflosculi (ad 12), flavi. Semen striatum: striis dente terminatis. Pappus densus albissimus, quatuor lineas longus; stipite lineam longo.

960. LACTUCA *virosa*.

Lactuca foliis horizontalibus, carina aculeatis, dentatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 520. *Spec. Plant.* p. 795. n. 3.

Lactuca foliis ovatis patulis; nervo spinoso. HALL. *Hist.* n. 15.

DIAGN. *Semen apice aculeatum; striis supra medium tuberculosis.*

Habitat *Tergesti* et *Goriziae*.

Maculae in caulis ramisque sanguineae, dein nigricantes. Ima pars caulis paleolis crebris rufisque strigosa. Folia modo aliqua glabra et inermia, caulina vero lanceolata sessilia et crebris aculeis parvis in margine exasperata; modo vero obiter dentata; dentibus parvo aculeo terminatis. Alia iterum folia habent LACTUCAE I. BAUHINI a LINNAEO citatae, ut facile pro distinctis speciebus haberri possint.

Tab. 49.

