

base, se terminant au sommet en un bec 3-4 fois plus court que lui, à côtes (8-10) dont deux plus larges, presque en forme d'ailes étroites.

Diagnose latine.

Radix crassa ; caulis statim a basi divisus et quasi in flabellum expansus, striatus, glabrescens ;

Folia, ut illa *Lactucæ muralis* sed minora, lobo terminali triangulo majori, glabra, viridia sed infra pallidiora ;

Inflorescentia late corymbosa ; capitula multa, parva, lutea, pauciflora ; involucre phyllis exterioribus longis, angustis, acutis ; exterioribus parvis ad modum calyculi ;

Pappus albus, pilis simplicibus ;

Akenium insigne colore rubro, latericio ; ad basim attenuatum, apice in collum ipso quadruplo brevius angustatum, costis (8-10), quarum una et altera in alas angustas acutae videntur.

Chine, Kouy-tchéou ; Kouy-yang. C. sur les murs des jardins ; rocaïles.

Emile Bodinier legit, 15 juin 1899. Herbarium Bodinier, n° 2621.

Lactuca (Mycelis) pseudosenecio sp. n.

Racine grosse, donnant naissance à plusieurs tiges glabres, striées, très grêles et très hautes, se divisant en rameaux, portant à diverses hauteurs et aux extrémités des fleurs agglomérées ;

Feuilles radicales, longuement pétiolées, roncées-ondulées ; à dernier segment arrondi beaucoup plus grand que les autres ; rappelant bien celles du *Senecio aquaticus* ; glabres, à page inférieure plus pâle ; les caulinaires pétiolées, roncées, à lobes garnis de longues dents ;

Capitules très petits, nombreux, à longs pédicelles munis de bractéoles ;

Involucre à folioles intérieures longues, étroites ; à folioles extérieures courtes, en calicule ;

Fleurs relativement nombreuses (12-14) pour la grosseur du capitule, jaunes ;

Aigrette simple, blonde, égalant l'involucre sans le dépasser ;

Akène très petit, cendré, aplati, un peu ailé, paraissant lisse, atténué en un bec très court, épais.

(A suivre).

PLANTÆ BODINIERIANÆ

COMPOSÉES

PAR M. EUG. VANIOT (*suite*)**Lactuca pseudosenecio** *sp. nov.**Diagnose latine.*

Radix, crassa, promittens aliquot caules glabros, striatos, graciles et altos; e quibus rami nascuntur, ad diversas altitudines et in fastigiis flores glomeratos ferentes;

Folia radicalia longe petiolata, runcinato-undulata, ultimo lobo rotundato et multo ceteris majore, *habitu foliis senecionis aquatici bene similia*, glabra, viridia, infra vero pallidiora; caulina petiolata, runcinata, lobis longe dentatis;

Capitula parva, multa, longe pedunculata cum bracteolis;

Involucrum phyllis interioribus longis, angustis; exterioribus parvis, calyculatis;

Flores pro capitulo sat multi (12-14,) lutei;

Pappus simplex, albus, involucrum aequans, sed non superans.

Akenium parvum, cinereum, compressum necnon alatum, laeve (ut videtur), in collum breve et crassum attenuatum.

Espèce bien caractérisée par la forme de ses feuilles radicales, par ses tiges hautes et grêles, par ses capitules nombreux et petits, et pourtant non pauciflores.

Chine; environs de Yuan-ran-sen; sur les murs, les talus; dans la plaine.

Ducloux legit, 7 février 1897. Herbar Bodinier, n° 68.

Gynura pinnatifida *sp. nov.*

Tige herbacée, striée-anguleuse, glabre, très rameuse, haute de 60-80 cent.;

Feuilles alternes; pinnatifides, à lobes allongés, étroits, acuminés, fortement sublobés et dentés, les inférieurs très écartés, les inférieurs confluent, le dernier grand, très profondément divisé, denté; toutes auriculées-embrassantes, à oreillettes arrondies épineuses;