

Habitat — — — — — ⊙ (v. v.)

An haec et praecedens varietates L. sativae? sed e feminibus educatae constantes manent. W.

* 4. **LACTUCA** *intybacea*.

L. foliis runcinatis, dentato-ciliatis obtusis amplexicaulibus sagittatis, radicalibus obovatis, caule paniculato. W.

L. foliis runcinatis dentato-ciliatis obtusis amplexicaulibus, caule paniculato. *Jacq. ic. rar. 1. t. 162. Collect. 1. p. 53.**

Cichorienartiger Salat. W.

Habitat in America meridionali. ⊙ (v. f.)

* 5. **LACTUCA** *racemosa*. W.

L. foliis lyrato-runcinatis acuminatis amplexicaulibus, summis lanceolatis integerrimis caule simplici. W.

L. orientalis dentis Leonis folio, flore leucophaeo. *Tournef. cor. 35.*

Traubiger Salat. W.

Habitat in Armenia. (v. f.)

Radix forte perennis. Caulis pedalis vel pollicaris simplex erectus. Folia inferiora lyrato-runcinata inaequaliter argute dentata basi attenuata integerrima amplexicaulia, apice cuspidato-acuminata, glabra, subtus pallidiora. Folia summa lanceolata acuminata integerrima. Racemus simplex terminalis. Bractæae subulato-lanceolatae amplexicaules ad pedunculorum basin. Flores parum majores quam in praecedente. Squamae calycinae laxae. W.

6. **LACTUCA** *quercina*.

L. foliis subtus laevibus inferioribus runcinatis denticulatis, basi dilatatis sagittatis, superioribus lanceolatis sagittatis; panicula stricta. W.

L. foliis runcinatis denticulatis acutis, subtus laevibus, caule glabro. *It. gotl. 289.** *Fl. suec. 646; 691.** *Scholl. barb. n. 635.* *Hoffm. germ. 276.* *Roth. germ. I. 337. II. 257.*

L. foliis quernis. *Raj. hist. 221.*

Eichblättriger Salat. W.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 32.