

gradatim minoribus extimisque sæpe foliaceis magnis; antherarum caudis elongatis simplicibus connatis; achæniis subteretibus 10-costatis apice hirsutis; pappo exteriori cupuliformi paleaceo-lacero, interioribus setis complanatis.

Socotra, in montibus Haggier prope Tamarida. B.C.S. Nos. 402, 481.

80. *SENECIO (KLEINIA) SCOTTI*, *Balf. fil.*: perenna erecta glabra succulenta multo-ramosa, caulibus subteretibus; foliis remotis parvis linearibus; capitulis subcylindricis homogamis 6–8-floris ad extremitates ramorum solitariis v. 2–3 in cymas breviter pedunculatas aggregatis; phyllariis 5–6 linearibus cuspidatis floribus dimidio brevioribus; receptaculo nudo; achæniis subteretibus 10-costatis brevibus rigidis setulis intercostalibus; pappo corollæ vix æquilongo.

Socotra, in montibus Haggier prope Tamarida. B.C.S. No. 446.

81. *EURYOPS SOCOTRANUS*, *Balf. fil.*: suffrutex 3-pedalis glaber bipartim ramosus ramis cicatricosis; foliis sessilibus arcte trifidis, segmentis linearibus obtusis; pedunculis foliis vix æquilongis; phyllariis 8 connatis; achæniis hispidis.

Socotra, in montibus altissimis Haggier. B.C.S. No. 401. Schweinf. No. 673. Hunt. No. 11.

82. *DICOMA CANA*, *Balf. fil.*: prostrata cano-tomentosa lignosa; foliis linearibus obtusis sessilibus crassis persistentibus; capitulis solitariis pseudo-terminalibus subsessilibus paucifloris homogamis discoideis; phyllariis pallidis glabris, intimis membranaceis, exterioribus gradatim minoribus rigidis subulato-punctatis; receptaculo alveolato; achæniis dense setosis; pappi setis conformibus serrulato-barbellatis.

Socotra, in montibus prope Gollonsir. B.C.S. No. 757.

83. *LACTUCA RHYNCHOCARPA*, *Balf. fil.*: herba tenuis glabra depressa v. a basi ramosa caulibusque suberectis; foliis glaucis lyratopinnatipartitis, segmento terminali oblongo-acuto v. rotundato v. panduriformi subaculeato-dentato, segmentis inferioribus gradatim minoribus runcinatis, radicalibus breviter petiolatis subamplexicaulibus, caulinibus sessilibus; capitulis parvis 10–12-floris $\frac{2}{5}$ poll.

longis oppositifoliis in laxos pseudo-racemos dispositis ; phyllariis intimis ensiformibus obtusis post anthesin vix basi incrassatis, extimis parvis ovato-acutis ; achæniis vix compressis 4-gonis costis 1-2 in quoque facie conspicuis, infra angustatis, apice in rostrum longum abrupte productis ; pappi setis serrulatis.

Socotra, in campis. B.C.S. Nos. 217, 595. Schweinf. No. 398.

84. *LACTUCA CRASSIFOLIA*, *Balf. fil.* : herba perenna glabra glauca valida divaricatim breviter ramosa ; foliis crassiusculis lyrato-pinnatifidis, segmento terminali oblongo-acuto v. obtuso calloso-dentato et sæpe inæqualiter lobato, lobis inferioribus irregulariter ad basin minoribus, radicalibus vix petiolatis amplexicaulibus, caulibus sessilibus auriculatis ; capitulis 20-floris $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ poll. longis oppositifoliis in pseudo-racemos breves dispositis ; phyllariis intimis æqualibus linearibus marginatis, extimis paucis late ovatis minoribus ; achæniis basi truncatis in rostrum breve pallidum productis ; setis pappi scabridulis achæniis æquilongis.

Socotra, in campis. B.C.S. No. 595.

85. *PRENANTHES AMABILIS*, *Balf. fil.* : herba perennis cano-lanuginosa caule erecto in inflorescentiam abeunte ; foliis lyrato-runcinatis, lobo terminali rotundato v. acute lobato parte inferiore sæpe angustissimo, amplexicaulibus axillariter lanato-villosis membranaceis glabris ; capitulis longe pedunculatis 5-6-floris in laxe ramosas paniculas dispositis ; phyllariis intimis 5-6 linearibus acutis, exterioribus brevibus ; achæniis tetragonis truncatis basi angustatis pappo sordido setoso serrulato brevioribus.

Socotra, in montibus prope Gollonsir. B.C.S. No. 311.

86. *LAUNÆA CREPOIDES*, *Balf. fil.* : herba rosulata glabra perennis ; foliis spathulatis v. oblanceolatis basi longe attenuatis obtusis integris ; capitulis solitariis in apices scaporum longorum bracteolatorum v. in laxas 2-3-ramosas cymas dispositis ; phyllariis intimis 8 linearibus ; calyculi squamis paucis ovatis herbaceis ; styli lobis setulis nigris suffultis ; achæniis linearibus subfusiformibus multocostatis rugosis ; pappo exteriori lanoso-intricato, intimo setoso.

Socotra, in montibus non infrequens. B.C.S. No. 307. Schweinf. No. 570.