

l'*Anemone palmata*; y est très rare. Pas plus commun à Aubagne : Camp-Major et Fenestrelle.

IRIS OLBIEWSIS Hén. Mon *Petit Coin* avait déjà signalé cette plante dans les B.-du-Rh. Croît aussi à Aubagne : vers La Tuilière.

POLYPODIUM VULGARE var. SERRATUM Sch. Aubagne : vallon de Toupin. Les Pennes : Bas Cadenaux. Etc. — ASPLENIUM TRICHOMANES var. ACUTILOBUM N. (? *Trichomanes foliis eleganter incis* Dill., variété indiquée à Saint-Tronc près Marseille, par Castagne). Lobes des segments aigus et dirigés un peu obliquement; segments obtus-crênelés chez le type. Cassis : calanque des Vaux. Marseille : calanque de Sugiton; rochers de Mont-Redon; escarpement de Barre au couchant de la propriété De Foresta, à La Viste. — Même espèce, var. LOBATO-CRENATUM DC. Allauch : vallons de La Bourdonnière. Aubagne : défilé de La Masque. — Même espèce, var. AURICULATUM Milde. Marseille : à Séon. Variation plutôt que variété, toutes les frondes d'un même pied sont loin d'offrir cette curieuse aberration, fort rare. — SCOLOPENDRIUM SAGITTATUM DC. Mêlé, dans le massif de Marsilho-Veïré et à l'île de Maïré, à la forme *Hemionitis*. — ADIANTHUM CAPILLUS-VENERIS var. MULTIFIDUM De Rey-Pailh. Saint-Antoine, parois intérieures d'un puits et grotte voisine, au vallon de Peïrar.

(A suivre).

Alfred REYNIER.

PLANTÆ BODINIERIANÆ

COMPOSÉES

PAR M. EUG. VANIOT (suite)

***Lactuca (scariola) rubrolutea* sp. n.**

Racine assez épaisse, donnant naissance à plusieurs tiges striées, entièrement glabres, simples, se partageant au sommet en rameaux pauciflores formant des corymbes très contractés ;

Feuilles radicales roncînées, à lobes très étroits et très écartés, glabres, à limbe décurrent sur le pétiole plus ou moins

ailé; les caulinaires peu nombreuses, devenant lancéolées entières vers le sommet;

Capitules assez gros, souvent solitaires à l'extrémité des rameaux; involucre à folioles intérieures longues et étroites, les extérieures petites, formant calicule; *Fleurs jaunes veinées de rougeâtre*;

Aigrette simple, blanche, longuement pédicellée;

Akène roux, atténué à la base, terminé par un col au moins deux fois plus long que lui, à 8-10 côtes transversalement striées.

Diagnose latine.

Radix subcrassa, plures emittens caules striatos, glabros, simplicis, ad apicem divisos in ramos paucifloros inflorescentias angustas efformantes;

Folia radicalia runcinata, lobis angustis et discretis, glabra, limbo decurrente in petiolum plus minusve alatum; caulina pauca, ad apicem lanceolata integra evadentia;

Capitula mediocria, saepe solitaria in ramorum fastigio; involucrum phyllis interioribus longis angustis, exterioribus parvis et calyculatis;

Flores *lutei, rubro venati*;

Pappus simplex, albus, longe pedicellatus;

Akenium rufum, ad basim attenuatum, supra desinens in colum exile ipso duplo saltem longius, 8-10 costatum, costis transverse striatis.

Chine; Pékin, parc impérial de Pan-chan, bord des eaux.

Emile Bodinier, mai 1889. Herbar Bodinier, sans n°.

Lactuca (Mycelis?) lignea sp. n.

Racine dure, donnant naissance à plusieurs tiges ligneuses striées, glabres, se divisant dès la base en rameaux nombreux, subdivisés en d'autres rameaux, portant chacun une fleur à son sommet, dressés et constituant un corymbe serré;

Feuilles radicales et caulinaires rares, linéaires, courtes, donnant à la plante un aspect sec et dénudé;

Capitules nombreux, petits; involucre à folioles intérieures