

Hab. In Himalaya boreali-occidentali a Nepalia ad Kashmir ad 2,000-8,000 ped. alt. mens. Aug.-Oct. florens.

(8.) *Lactuca brevirostris* Champ. in Walp. Ann. V. p. 324.

Glabra. Caulis 2-5-pedalis sursum paniculatus. Folia lineari-lanceolata elongata integra sessilia, basi haud dilatata interdum auriculato-hastata. Capitula elongato-paniculata, 12-20-flora. Phyllaria interiora 6-8 inæqualia elongata oblonga exteriora ovata lanceolatave. Achænia valde compressa ecostata elliptica alata nigra in rostrum filiforme albidum achænio 2-3-plo brevius angustatum. Pappus tenuis sordide albus achænio cum rostro longior. Pappus exterior nullus. Flores cærulei.

Hab. In Khasia ad 4,000-5,000 ped. alt. mens. Sept.-Oct. florens. In Assam (in collibus ?) In Sikkim in convalle fluminis Rungeet leg. T. And.

Distributio. In Hongkong.

(An eadem ac *Lactuca indica* L. in DC. VII. 136 quærit T. Thoms. in ms.)

(9.) *Lactuca sagittarioides* i. e. *Lactuca sagittata* Hook. f. et Th. in Herb. Chondrilla sagittata Wallich Cat. 3270.

Caulis puberulus simplex erectus fere nudus 1-2-pedalis apice corymbosus. Folia, omnia subradicalia, hastato-triangularia acuta aut sagittata, serrata aut integra, longe petiolata petiolo plus minus alato basi dilatato; supra pubescenti-scabrida aut glabrata subtus glabra. Folia caulina pauca bracteæformia lanceolata basi latiora interdum auriculata. Corymbus haud magnus ad bifurcationes bracteis lanceolatis ornatus. Capitula parva 8-16-flora. Phyllaria interiora 8-12 anguste oblonga æqualia apice vix marcescentia, exteriora parvula. Achænum parum compressum utrinque 3-striatum minutissime scabridum apice attenuatum albescens. Pappus tenuis albus achænio longior: pappus exterior nullus.

Hab. In Himalaya boreali-occidentali ad 6,000 ped. alt. coll. T. Thoms. [Nynee Tal T. Thoms.: Dhurmsala C. B. Clarke.] In Nepalia leg. Wallich. In Burma superiore ad Momyen ad 1,200 ped. alt. leg. J. Anderson. Mens. Jan.-Martio floret. Nomen *Lactuca sagittata* jam præoccupatum est cf. DC. VII. p. 136.

Hæc species cum nullo alio facile confundi potest. Sed multum

dubito an sit recte *Lactuca*. Habitus, phyllaria et pappus potius *Crepidis*: sed achænia (in exemplis mihi obviis non bene maturatis) revera compressa videntur. Phyllaria post anthesin immutata.

- (10.) *Lactuca Brunoniana* Wallich Cat. 3261 et 3278. *Prenanthes Brunoniana* DC. VII. p. 195 *Prenanthes graciliflora* Wall. Cat. 3260 *Lactuca graciliflora* DC. VII. p. 139 [*Prenanthes raphanifolia*? DC. VII. p. 195.]

Glabra aut villis laxis inspersa. Caulis erectus 2-6-pedalis superne ample paniculatus. Folia inferiora petiolata lyratopinnatifida segmentis ellipticis aut rhomboideo-lanceolatis serratis, glabra aut laxis villis obsita. Folia caulina superiora sæpe anguste lanceolata. Capitula anguste cylindrica purpurea 3-4-flora. Phyllaria interiora 3-4 anguste oblonga, exteriora parvula. Achænia compressa, facie interiore 3-5 striata, facie exteriori 5-7-nervia, fusca lævia, apice rostro brevi crassiusculo exacte cylindrico terminata. Pappus interior achæniū adæquans sordide fuscus, exterior ex setis minutissimis dense approximatis coalitus.

- a. *Brunoniana* (sp. Wallichii.) Sæpius glabra. Achæniū margine incrassati læves, apice in rostrum subito angustati.
 β. *graciliflora* (sp. Wallichii.) Sæpe villis obsita. Achæniū margines vix incrassati, apice sensim in rostrum attenuati. Capitula quam *L. brunonianæ* minora.

Hab. (a et β.) In Himalaya, in provinciis Sikkim, Nepalia et Kemaon: ad 5,000-10,000 ped. alt. mensibus Aug.-Oct. florens.

Mulgedium rostratum Schultz Bip. = *Prenanthes rostrata* Blume in DC. VII. p. 195 videtur ex exemplis Javensibus eadem.

Cf. *Prenanthes* Khasianam infra quæ achæniis longe differt.

- (11.) *Lactuca decipiens* Hook. f. et Th. in Herb. sub *Mulgedio*.

Caulis 2-4-pedalis glaber apice corymbosus. Folia inferiora runcinato-pinnatifida petiolata, petiolo basi dilatato segmento terminali sæpe cordato aut hastato triangulari. Folia caulina sessilia auriculato-amplexicaulia plus minus pinnatifida segmentis inciso-dentatis. Phyllaria interiora c. 8 elliptico-lanceolata subæqualia dorso villis hirsuta, exteriora ovalilanceolata. Flores 8-10 cyanei. Achæniū compressum an-