

*Habitat* - - - - - ☉.

*Cultura mangonio forte producta ex proximis.*

3. LACTUCA foliis lanceolato-ensiformibus dentatis canadensis, inermibus.

*Lactuca canadensis altissima angustifolia, flore pallide luteo. Tournef. inst. 474.*

*Sonchus sylvestris, folio laciniato glauco: costa non spinosa. Raj. suppl. 137.*

*Habitat in Canada. Kalm.*

*Differt a L. Caule sativa altiore; Foliis quadruplo longioribus angustioribusque; Racemo terminali longo, composito, nec corymboso.*

4. LACTUCA foliis verticalibus carina aculeatis. *Amœn. Scariola. acad. 4 p. 328. \**

*Lactuca sylvestris costa spinosa. Bauh. pin. 123.*

*Lactuca sylvestris laciniata. Moris. hist. 3: p. 58. f. 7. t. 2. f. 17.*

6. Lactuca sylvestris italica, costa spinosa, sanguineis maculis adpersa. *Herm. parad. 191. t. 191.*

7. Lactuca sylvestris annua, costa spinosa, folio integro colore cæcio. *Moris. hist. 3. p. 58.*

*Habitat in Europæ australi. ☉.*

*Folia radicalia sinuata. Raj.*

5. LACTUCA foliis horizontalibus carina aculeatis densi-virosa. *Gouan. monsp. 408.*

*Lactuca epule foliisque aculeatis. Hort. cliff. 384. \*. Roy. lugdb. 121. Dalib. paris. 236. Sauv. monsp. 295.*

*Lactuca sylvestris, odore viroso. Bauh. pin. 123. Moris. hist. 3. p. 58. f. 7. t. 2. f. 16.*

*Habitat in Europæ australioris aggeribus, sepibus.*

*Folia prima s. radicalia integra. Raj. angl. 3. p. 161.*

6. LACTUCA foliis hastato-linearibus sessilibus carina saligna, aculeatis. *Amœn. acad. I. p. 150. Gouan. monsp. 408.*

*Lactuca foliis linearibus hastatis: inferioribus dentatis. Roy. lugdb. 121.*

*Lactuca foliis imis pinnatifidis, cæteris ensiformibus basi hastatis, dorso ferratis. Sauv. monsp. 692.*

*Lactuca foliis radicalibus linearibus dentato-pinnatis: laciniis sursum dentatis: cauliculis alato-lanceolatis, floralibus linearibus sessilibus. Guett. stamp. 374. Dalib. paris. 236.*