

spongiosum contracta, multicostata, costis 4-5 crassioribus, intermediis tenuibus; pappus basi in anulum persistentem concretus, setis sordide albis, fragillimis, involucrium ad maturitatem vix superantibus.

*Hab.* — Yunnan, glaciers de Likiang, alt. 4000 m. (Delavay, n. 2460).

Bien caractérisé, dans la section *Glomeratæ*, par ses involucries formés de 10-12 folioles bisériées; par ses capitules assez gros, longuement pédonculés; par ses achaines surmontés d'un disque épais, spongieux, qui porte l'aigrette.

### **C. trichocarpa.**

(*Glomeratæ*.) — Rhizoma gracile, elongatum, squamiferum; caulis epigæus brevis, apice late dilatatus, cavus, foliatus, foliis omnibus perfecte evolutis, longe petiolatis, petiolo alato; limbus crassus, glaucus, oblongus vel lanceolato-oblongus, runcinatus, lobis sinu lato disjunctis, triangularibus, apice mucronatis, margine brevissime ciliolatis, nervo medio crasso, secundariis inconspicuis; capitula permulta, dense congesta, pedunculis 1-2 cent. longis, glabris, paucibracteis; involucri phylla 5, lanceolato-oblonga, obtusa, 15-18 mill. longa, glabra vel setis raris conspersa, late albo marginata; ligulæ luteæ, tubo filiformi; achænia (haud matura) lutea, columnaria, multi-striata, crebre pilosula, apice distincte attenuata, in discum tenuem, annularem abeuntia; pappus rufescens, vel sordide albidus, nunc prima ætate æneus, setis vix in anulum concretis, facile secedentibus, fragillimis.

*Hab.* — Su-tchuen: circa Ta-tsien-lou; in pascuis siccis prope Tongolo, ad Dara-tha-pong; in collo Tche-to-chan (R. P. Faurie).

Plus robuste que le *C. Hookeriana*; il est surtout caractérisé par ses achaines pubescents, particularité qu'on n'observe pas dans les autres espèces de la section.

### **Lactuca Souliei.**

(*Aggregatæ* sect. nov.) — Caulis subnullus, apice dilatatus cavus; capitula angusta, sessilia, dense congesta.

Cette section se comporte, parmi les *Lactuca*, comme la section *Glomeratæ* parmi les *Crepis*.

Rhizoma gracile, longe reptans, crebre radiculiferum, partitum; caulis epigæus brevis vel brevissimus; folia inflorescentiam cingentia et superantia, laxe lanuginosa, coriacea, longe petiolata, lyrata, lobis angulato-dentatis, terminali triplo majore, usque 2 cent. longo, e basi leviter cordata ovatis, sinuato-dentatis, lateralibus 3-6 mill. nunc fere abortivis; capitula plurima, dense aggregata, stricte sessilia, anguste cylindrica, 12-14 mill. longa; involucri phylla 5-6, subscariosa, pallida, albo marginata, extus parce setulosa, linerari-lanceolata, apice nigrescentia; ligulæ violaceæ; achænia fusca, oblongo-obovata, compressa, basi valde angustata, in collum brevem contracta, marginata, faciebus tricostata; discus pappiferus cupuliformis, pappo albo involucrum paulo superans.

*Hab.* — Su-tchuen oriental, in arenosis ad Ta-tchien-lou, in loco dicto Ouatry (R. P. Soulié, n° 124).

Le *L. Souliei* a tout à fait l'aspect d'un *Crepis* du groupe des *Glomeratæ*, mais les achaines très comprimés sont ceux d'un *Lactuca*. Les folioles de l'involucre sont toutes de même longueur, sans folioles accessoires extérieures courtes, comme on en voit dans les autres *Lactuca*.

### **L. hirsuta.**

(*Cicerbita*?). — Annuæ, setis sordidis tota hispida, glandulis nonnullis intermixtis; caulis 6-12 poll., dense foliatus; folia inferiora sub anthesi emarcida, deflexa, omnia petiolata, petiolo alato basi dilatata amplexicaule, lyrata, lobis lateralibus paucis (sæpius 4), triangulatis vel rhomboideis, acutis vel obtusis, argute dentatis, terminali quadruplo majore, late cordiformi, argute duplicato-dentato; folia superiora sessilia, lanceolata vel ovata, inæqualiter serrata; inflorescentia anguste racemosa, ramuli (præter supremos) axillares, breves subtriflori; capitula cernua, hispida, cylindracea, 15-18 mill. longa, 3-4 mill. lata, supra medium parum constricta; involucri bracteæ 5, oblongæ, obtusæ, late marginatæ, olivaceæ, apice coloratæ, exterioribus vix conspicuis; flores circiter 8, lutei; achænia (incluso rostro) 1 cent. longa, fusca cum maculis albidis, leviter compressa, anguste oblonga, in rostrum apice albidum sensim attenuata, dense striata, costulis levibus, nonnullis crassioribus; discus pappiferus planus, pappi setis sordidis, fragilibus, achæniis paulo brevioribus.