

dorso compressa apice in rostrum distinctum vel breve, robustum vel filiformi-capillaceum. concolor vel album abeuntia. Pappus pilosus disco ad apicem rostri sito insidens. — Herbæ monocarpicæ vel perennes, rarius suffrutescentes, floribus luteis vel cæruleo-violaceis, habitu vario.

Specierum Orientalium distributio.

§ 1. **Tuberosæ.** Capitula magna pluriflora. Achenia magna valde compressa utrinque subuninervia vel obsolete trinervia abrupte et saepius longe rostrata. Pappus persistens. Radix tuberosa biennis.

L. Cretica, tuberosa, Persica, crambifolia, picridiformis.

§ 2. **Scariolæ.** Capitula mediocria pluriflora. Achenia compressa utrinque 5-9-nervia abrupte rostrata. Pappus a disco cito deciduus. Radix verticalis fusiformis vel tenuis.

* Biennies.

L. sagittata, stricta, Wilhelmsiana, virosa, Scariola, aculeata, saligna

* * Perennis.

L. scarioloides.

§ 3. **Alpinæ.** Capitula mediocria pluriflora. Achenia compressa utrinque 1-vel trinervia abrupte rostrata. Radix perennis.

* Pappus persistens.

L. brassicæfolia, intricata, Græca.

* * Pappus deciduus.

L. polyclada, glareosa.

§ 4. **Micranthæ.** Capitula minuta 10-12-flora. Achenia compressa utrinque 1-3-nervia abrupte longe et tenuissime rostrata.

* Biennis. Pappus persistens.

L. rosularis.

* * Annuæ. Pappus a disco cito solutus.

L. undulata, glaucifolia, auriculata.

§ 5. **Mulgedioideæ.** Capitula pluriflora. Achenia compressa

utrinque 5-9-nervia in rostrum breve concolor sensim attenuata. Pappus a disco cito solutus.

* Cyanicæ.

L. adenophora, mulgedioides, Cataonica, seticuspis.

* * Xanthinæ.

L. sonchoides, deltoidea.

§ 6. **Quinquefloræ.** — Gen. *Phænopus* Cass. — Capitula quinqueflora. Achenia in rostrum sæpius abbreviatum attenuata. Pappi setæ a disco solutæ.

* Perennes, radice præmorsâ.

L. muralis, brevirostris.

* * Biennes, radix fusiformis.

L. acanthifolia, viminea.

* * * Suffrutescentes.

L. Orientalis, triquetra.

§ 1. Tuberosæ.

1. **L. Cretica** (Desf. Cor. Tourn. 44, tab. 34) glaberrima glaucescens, radice tuberosâ ovatâ interdum lobatâ, caule crasso simplicitereti folioso in paniculam terminalem racemosam abeunte, foliis oblongo-lanceolatis infimis in petiolam attenuatis cito emarcidis cæteris a basi semiamplexicauli plus minus manifeste auriculatâ runcinato-laciniatis denticulatis rarius indivisis, floralibus squamæformibus acuminatis, paniculæ pedunculis crassis patentibus squamulosis brevibus 1-2-cephalis, capitulis magnis ovato-cylindricis multifloris, involucri phyllis latis obtusis imbricatis ab infimis ovatis ad superiora late linearia sensim auctis, flosculis luteis, acheniis nigris ovatis compressissimis abrupte mucronulatis subuninerviis rostro tenuissimo albo eis 2-3-plo longiore superatis ②. *L. leucophæa* Fl. Græc. VIII, p. 69, tab. 794. — *L. Cretica sonchifolio flore pulchro* Tourn. Cor. 24.

Hab. in collibus et fruticetis regionis inferioris, Græcia in Peloponneso (Bory), Atticâ (Sprun!, Orph!), Cretâ (Tourn., Heldr!), Cycladibus (Urv!, Bourg!), Macedoniaustrali (Friv!), Lydiâ ad Smyrnam (Boiss! Bal!), Lyciâ (Bourg!), Ciliciâ (Bal!), Syriâ littorali (Bl!), Palestinâ in Carmelo (Boiss!). Fl. Mai.