

la manière d'être de celui-ci étant d'ailleurs également différente de celle de la variété suivante, var. *Thuretii*.

(*A suivre.*)

← →

PLANTES NOUVELLES DE LA CHINE OCCIDENTALE

(*Suite.*)

Par M. A. FRANCHET.

SECT. *Prenanthesiæ*. — Capitula Sectionis *Sororiiæ*; achænia pluricostata, nunc leviter compressa, nunc angulata, costis 4-5 crassioribus, apice truncata vel sub pappo angustissime constricta, nullo modo vel vix conspicue superne attenuata.

Cette section comprend les *Lactuca* à capitules cylindriques pauci-flores, dont les achaines sont nettement tronqués au sommet ou tout au moins ne présentent aucune atténuation bien sensible; ils peuvent néanmoins offrir une constriction brusque sous l'aigrette. Cette section *Prenanthesia* correspond aux *Prenanthes* du *Flora indica*, de M. Hooker, qui ne sont eux-mêmes qu'un démembrément du genre *Prenanthes* tel que l'avait compris Linné, c'est-à-dire sans tenir compte de la forme des achaines, et qui se trouverait reconstitué selon l'esprit de l'auteur, par la réunion des trois groupes, admis ici comme sections : *Oliganihæ*, *Sororiiæ* et *Prenanthesiæ*, dont les achaines représentent, d'ailleurs, trois types différents.

L. melanantha.

(*Prenanthesia*).—Elate, ultratribedalis; caulis obscure striatus superne dense glandulosus, glandulis brevissimis, totus foliosus; folia omnia petiolata, petiolo anguste alato lobuloque hinc inde aucto, basi nullo modo dilatato neque amplexicauli; limbus papyraceus, utraque facie ad nervos setulis conspersus, ambitu ovatus, lyratus, lobis lateralibus 2, basi lata confluentibus, deflexis, obscure sinuatis, lobo terminali triangulari, vel hastato-triangulare, acuminato, circumcirca denticulato, dentibus mucronatis; inflorescentia anguste racemoso-paniculata, pedalis, ramis gracilibus, bipinnicaribus, bractea subulata stipatis, glandulis atroviolaceis brevissimis dense vestitis; capitula 12-15 mill. longa, anguste cylindracea; involuci phylla interiora 5-6, linear-lanceolata, obtusa, atro-violacea, glabra, æqualia, exterioribus 3-4 brevissimis, acutis; flores 4-6, ligulis