

undis, foliis radicalibus obovato-oblongis inæqualiter dentatis subrosulatis, canlinis angustè oblongis paucis, capitulis paucis subcorymbosis, pedicellis fistuloso-incrassatis, invol. squamis dorso pilosis, exter. lanceolatis subadpressis.  $\mathcal{U}$  in Barbariæ collibus incultis et in Atlante (Desf.), in Siciliâ (Gnss.). Pieris aculeata Vahl symb. 2. p. 89. mal. et excl. Tourn. syn. Desf. fl. alt. 2. p. 221. Helm. hispida pedunculis florum tumentibus Vaill. act. ac. par. 1721. p. 206. Achænum transversè subrugosum, longè ad apicem rostratum. (v. s. comm. à cl. Guss.)

+ *Species exclusa.*

H. SPRENGERIANA Gærtn. = Pieris pauciflora.

Subtrib. VII. LACTUCEÆ Less. syn. 135. *Don in linnæâ* 1831. litt. p. 139. non Cass. — Lactuceæ veræ et Crepideæ Cass. opusc. 3. p. 44 et 45.

Recept. epaleaceum aut rarissimè paleaceum. Pappus piliformis argenteus mollissimus fugax, pilis exactissimè linearibus nec basi complanatis nec plumosis.

DCCCXVIII. LACTUCA Tourn. inst. p. 477. t. 267. *Linn. gen. n.* 909. Gærtn. fr. 2. p. 361. t. 168. Less. syn. 135. — Lactuca et Mycelis Cass.

Capit. pluri- seu pauciflorum. Invol. cylindricum calyculato-imbricatum 2-4-seriale, seriebus exter. brevibus. Recept. nudum. Achænia plano-obcompressa exalata abruptè in rostrum filiforme producta. — Herbae in hemispherâ boreali (paucis exceptis) dispersæ, sæpiùs glabrae. Capitula sæpiùs paniculata. Flores lutei, cœrulei, purpurei aut versicolores.

Sect. I. SCARIOLA. — Lactuca Cass. dict. 25. p. 61 et 164. v. 33. p. 300.

Invol. 2-4-seriale aut imbricatum aut quasi calyculatum, squamis exterioribus dimidiò tantum quâm interiores longis. Rostrum sæpiùs elongatum.

§. 1. Cyanicæ nempe floribus cœruleis purpurascensibus aut variatibus albis, nunquam flavis.

1. L. PERENNIS (Linn. sp. 1120), glabra glaucescens, caule erecto tereti apice subnudo laxè paniculato-corymboso, foliis omnibus pinnatifidatis, lobis linearibus acuminatis sursum dentatis, pedicellis elongatis bracteolatis, achænio rostro paulò breviore.  $\mathcal{U}$  in Europeæ collibus et montanis asperis apricis. Mill. icon. t. 157. bot. mag. t. 2130. Variat floribus cœruleis rariùs albis (Tabern. kraüt. 486. f. 2), foliis latioribus (Tab. kr. 487. f. 3) et angustioribus (Chabr. sciagr. 317. f. 4). Var. latifolia Wallr. sched. 440 lobo fol. extremo ovato-deltideo dentato insignita, est fortè L. sonchoides Lapeyr. abr. 461? (v. v.)

2. L. CICHLIFOLIA (DC. fl. fr. suppl. 434), glabra, caule erecto tereti apice subnudo laxè paniculato corymboso, foliis infer. basi attenuatis acuminatis runicinato-dentatis, dentibus acuminatis subretrorsis, summis integerrimis lanceolato-linearibus sagittatis, pedicellis bracteolatis, . . .  $\mathcal{U}$  in Pyrenæis orientalibus legit el. Coder. An var. L. perennis ex Bentham? (v. s.)

3. L. TUBEROSEA (Jacq. in Murr. syst. 713. hort. vind. 1. t. 47), glabra, radice tuberosâ fasciculatâ, caule tereti subsimplici erecto, foliis spinuloso-dentatis oblongis, infer. indivisis, superioribus sinnato-pinnatifidis, racemo subpaniculato terminali, capitulis breviter pedicellatis, achæniis setoso-seabridis rostro triplò ferè brevioribus.  $\mathcal{U}$  in convallibus montium Seidchadschi prov. Ader-