

tusissimo et integerrimo, nitido; basis petioli vaginans, multistriata, demum fibrillosa; folia superiora, 1—2 conformia sed sessilia amplexicaulia supremum sessile anguste lanceolatum; inflorescentia spicata, 20—25 cm longa ebracteata; capitula cylindrica mediocria, breviter pedunculata; bracteae involucrales lanceolatae obtusiusculae margine angustissime hyalinae, ligulae 20 mm, longe et angustissime unguiculatae, ungue limbum superantē; flosculi elongati, 15 mm, tubo longo; styli et stamina parum exserta; akenia cylindrica sulcata, 6 mm longa; flores lutei; pappus sordide albidus akenio paulo brevior. Pappo akenium aequante et bracteis non connatis distincta.

Corea: Quelpaert, in Rang Kyangi, rara; juill. 1908; remode contre la gale (Taquet, 994).

291. **Bidens Robertianifolia** Lévl. et Vant., nov. spec.

Caule robusto, tetragono-tetraptero, sulcato-striato, glabrescenti; folia illa *Geranii Robertiani* referentia, villosa et ciliata; capitula longe vel longissime pedunculata, erecta; bracteae involucrales hirtae et ciliatae, erectae; akenia villosula; aristae spinulis numerosis et refractis munitae.

A. *B. bipinnata* foliorum habitu et pubescentia; bracteis involucri non reflexis et hirtis et akeniis villosulis statim distincta.

Corea: Quelpaert, in incultis Hongno, 23 sept. 1908 (Taquet).

292. **Lactuca Senecio** Lévl. et Vant., nov. spec.

Radix perpendicularis, elongata; stirps multiceps; caules puberuli 10 cm circiter longi, erecti vel decumbentes; folia radicalia rosulata, longe petiolata, runcinata; caulinarum limbo polygonalia, petiolata, petiolo alato, dentibus remotis sed validis munita; suprema auriculata; flores lutei; capitula *Senecionem vulgarem* referentia; bracteae involucrales sublineares, uninerviae obtusae, capitulo aequilongae; akenia nigra, oblonga, costata, glabra; pappus sordide albidus akenium aequans.

Corea: Quelpaert, in arenosis Hallaisan, 1800 m, sept. 1908 (Taquet, 1046); in petrosis montium, sept. 1901 (Urb. Faurie, 425).

293. **Lactuca Taquetii** Lévl. et Vant., nov. spec.

Planta minuta elegans; radix fibrosa; folia runcinato-lyrata, taraxaciformia; scapi capillares, gracillimi, puberuli, foliis duplo longiores; inflorescentia subumbellata; pedicelli gracillimi, capillares, elongati uniflori; capitula parva; flores lutei; bracteae involucrales lanceolato-lineares, trinerviae, subobtusae, pallide virides, capitulo dimidio breviores; ligulae lanceolatae, truncato-dentatae; styli longe exserti lutei; stamina purpurea; akenia nigrescentia compresso-cylindrica, pappo niveo aequilonga.

Corea: Quelpaert in herbis Hongno, oct. 1908 (Taquet, 1059).

294. **Lactuca quercus** Lévl. et Vant., nov. spec.

Planta fruticosa mirabilis statim dignoscenda: stipite lignoso valde crasso, cortice rugoso griseo; ramis lignosis divaricato-procumbentibus, foliis inferioribus quercinis, illa *Q. Roboris* referentibus, foliis juvenilium ramorum subintegris, amplexicauli-auriculatis; capitulis umbellato-corymbosis, calyculatis, calyculo brevissimo; bracteis involucralibus lanceolatis, obtusis, trinerviis, floribus paucissimis 3—5; pappus ligulas bilobas et