

26. **L. seticuspis**, caule glabro tereti striato erecto inferne folioso superne stricte paniculato-glanduloso, foliis teneris subtus pallidioribus et parcissime setulosis infimis in petiolum basi dilatatum abeuntibus cæteris basi auriculâ amplâ ovatâ acute dentatâ amplexicauli suffultis omnibus pinnatisectis, segmentis utrinque subtornis oblongis acute dentatis terminali vix majore præsertim in foliis superioribus setaceo-cuspidato, capitulis longiuscule pedunculatis cylindricis 8-10-floris, involucri glabri phyllis sphacelatis obtusis ab infimis triangularibus ad intima linearia apice ciliolata auctis, flosculis cæruleis, acheniis ellipticis compressis crasse marginatis utrinque subquinquecostatis ventre concavo valde carinatis apice scabridis in rostrum breve concolor disco terminatum attenuatis $\frac{7}{8}$. *Cephalorrhynchus Kotschyi* Boiss. et Reut. in Ky. Sched. 1862.

Hab. in sylvis pincis montis Amani Syria borealis inter Apisch Gaja et Akmadagh 5000' (Ky. 35!).

Bipedalis, folia inferiora 5-6-pollicaria segmentis 10-16 lineas longis; ab affinis *L. deltoideâ* et *Cataonicâ* segmentis terminalibus setaceo-caudatis, acheniis latoribus crasse marginatis carinatisque distincta. Ex commutatione acheniorum erroneè a nobis *Cephalorrhyncho* adscripta.

27. **L. sonchoides** (Boiss. et Bal. pl. exs. 1866) radice præmorsâ brevi nodosâ, caule elato tereti superne longe et composito paniculato, foliis paginâ inferiori parce et crispule setulosis infimis petiolatis cæteris sessilibus supra basin late ovatam cordato-amplexicaulem in lacinias 3-5 oblongas basi confluentes acute et grosse dentatas terminalem sæpius elongatam pinnatifidis, superioribus indivisis a basi latâ amplexicauli oblongis longe caudato-acuminatis, floralibus minimis squamæformibus lanceolatis, capitulis mediocribus multifloris ovatis, involucri glabriusculi livescentis phyllis imbricatis obtusiusculis ab infimis breviter lanceolatis ad intima linearia auctis, flosculis luteis, acheniis oblongo-lanceolatis compressis utrinque quinquestriatis apice gradatim attenuatis breviter rostratis (2).

Hab. in valle Djimil Ponti Lazici 6000' (Bal!).

¹ Planta 2½-3-pedalis foliorum formâ, capitulis et acheniis valde affinis *L. mulgedioidi* a quâ differt foliis subtus setulosis, paniculâ non corymbosâ, flosculis luteis, phyllis angustioribus, acheniis sublongioribus minus abrupte rostratis striis paucioribus.

28. **L. deltoidea** (M.B. Taur. Cauc. III, p. 529 sub *Prenanthe*) caule erecto elato glabro gracili fistuloso simplici folioso superne in paniculam brevem ovatam simplicem oligocephalam abeunti, foliis teneris subtus parce et breviter setulosis pallidis lyrato-pinnatisectis segmento terminali subcordato 3-5-partito lateralibus utrinque 1-2 oblongis subretrorsis decurrentibus omnibus denticulatis, petiolo foliorum inferiorum elongato basi sensim dilatato, foliis superioribus sessilibus basi auriculâ magnâ orbiculari dentatâ amplexicauli donatis, capitulis breviter pedunculatis parvis cylindricis 8-10-floris, invo-