

20. LACTUCA *perennis*.

L. foliis omnibus pinnatifidis, laciniis linearibus sursum dentatis, floribus corymbo-paniculatis. W.

L. foliis linearibus dentato-pinnatis: laciniis sursum dentatis. Hort. cliff. 384. Roy. lugdb. 121. Dabib. parif. 336. Mill. dict. t. 157. Gouan. monsp. 409. Reyg. ged. 1. p. 190. Scop. carn. n. 962. Pollich. pal. n. 730, Hoffm. germ. 276. Roth. germ. I. 338. II. 26b.

Chondrilla coerulea altera, cichorii sylvestris folio. Bauh. pin. 130.

Chondrilla coerulea latifolia laciniata. Bauh. pin. 130.

Chondrilla. Dod. pent. 637. coerulea. Tabern. 176.

Apate. Dalech. hist. 561.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 39.

Ausdaurender Salat. W.

*Habitat* in Germania, Helvetia, Gallia. 24 (v. v.)

21. LACTUCA *sonchifolia*. W.

L. foliis runcinato-pinnatifidis inaequaliter dentatis, floralibus lanceolatis, floribus racemosis. W.

Sonchus (*tuberosus*) pedunculis subquamosis, foliis runcinatis integrisque sagittatis sessilibus. Syst. veg. 594.

Sonchus (*tuberosus*) foliis inferioribus runcinatis, superioribus sagittatis. Lin. suppl. 346.

L. cretica sonchi folio laciniato, flore pulchro. Tournef. cor. 35.

Gänselfielblättriger Salat. W.

*Habitat* in Creta, Tauria, Tataria. 24 (v. f.)

Similis Soncho tatarico. Radix carnosa repens. Caulis bipedalis erectus ramosus teres laevis superne fuscus. Folia radicalia s. inferiora runcinata dentata, tenuissime denticulata, superiora sagittata amplexicaulia integerrima. Flores e summitate caulis pauciores pedunculati. Pedunculi vix calyce longiores squamati: squamis ovatis arctis. Calyces oblongi Scorzonerae imbricati: squamis ovatis obtusifusculis convexis. Corollae pallidae coeruleae, limbo vix duplo calycis longitudine. Semina obovata. Pappus pilosus stipitatus brevisimus.

Hanc speciem in Tauria detexit Clariss. de Boeber. Pappus longe stipitatus. Racemus simplex pauciflorus. Flores maiores quam in L. perenni. W.