

# Repertorium specierum novarum regni vegetabilis

auctore

F. Fedde

No. 185/187

VIII. Band

10. September 1910

## CCXXVI. Decades plantarum novarum. XLIII—XLIV.

Auctore H. Léveillé.

(Originaldiagnosen.)

### 421. *Bileveillea (Blumea) granulatifolia* Lévl., nov. spec.

Planta ad 2 m alta insignis et primo aspectu dignoscenda sequentibus notis; caule castaneo, lignoso; foliis 15—20 × 4—6 cm coriaceis, integerrimis, in petiolum alatum decurrentibus; margine revolutis, subtus concave supra convexa et valde reticulatis, impressis et granulis nitidis profuse munitis; inflorescentia quam amplissime paniculata; capitulis brunneis, bracteis imbricatis aristatis; receptaculo dense lanato-villoso; akoenio sensim contracto, quadrangulo; pappo sordido flores luteos et infundibuliformes aequante.

Kouy-Tchéou: Lo-Fou, mars 1909 (Jul. Cavalerie, 3708).

### 422. *Aster micranthus* Lévl. et Vant. var. *achilleiformis* nov. var.

Planta aspectu praesertim ante anthesin *Achilleam* referens et capitulis 3—4 ligulatis notata.

Corea: Quelpaert, in herbis Taipyeng, aug. 1909 (Taquet, 2987).

### 423. *Lactuca hoatiensis* Lévl., nov. spec.

Planta glabra, 1 m alta; folia inferiora magna, lanceolata, denticulata, alato-decurrentia, 25—30 × 5—6 cm, multinervata; superiora linearia vel aequaliter lata; inflorescentia laxa corymbosa; bractee involucales, inferiores ovato-triangulares, obtusiusculae, superiores lanceolatae, obtusissimae; akoenia nigra altera facie concava, altera facie carinata unde subtriangulata; pappus sordide albus akoenio longior.

Corea: Quelpaert, Hoatien, aug. 1909 (Taquet, 3010).

### 424. *Lactuca sonchus* Lévl. et Vant., nov. spec.

Radix perpendicularis; caulis 1,15 m altus, apice puberulo excepto, glaber; folia sonchiformia radicalia longissime petiolata caulinarum amplexicaulia auriculata, margine sinuata denticulata, ciliata; inflorescentia anguste paniculata; capitulis tamen aliquot axillaribus, remotis et sessilibus 3—7 aggregatis, bracteis acuminatis suffultis; bractee florales inferiores ovatae, superiores lanceolatae, uninerviae, supremae margine anguste hyalinae; capitula ad apicem contracta; akoenia nigra, compressa, faciebus unicostatis; pappus albidus, longissime pedicellatus, pedicello viridi, 5—6 mm longo; disco lato.

Kouy-Tchéou: Route de Pin-Fa à Kouy-Yang, juin 1906 (Jul. Cavalerie, 3706).

425. *Lactuca Cavaleriei* Lévl., nov. spec.

Planta glabra; caulis teres, robustus, striatus 1,50 m altus; folia late graminiformia uninervia 20—25 cm longa, 1 cm lata; inflorescentia late et longe paniculata; bracteae florales fuscae lineares, obtusae, margine hyalinae, flores lutei; akenia nigra compressa faciebus unicostatis; pappus rufus breviter pedicellatus, pedicello fulvo, disco angusto.

Kouy-Tchéou: Montagnes entre Ma-Jo et Long-Ly, 5 sept. 1907 (Jul. Cavalerie, 2908).

426. *Lactuca Beauverdiana* Lévl., nov. spec.

Planta elegantissima, glaberrima; caulis et rami angulati, striati; folia flaccida radicalia numerosa rosulata, in petiolum alatum longe attenuata, graminiformia; caulinarum angustissime lanceolata, sessilia acuminata, reticulata, integerrima, nervo primario vix ad medium folii subito sed non divaricate ramoso; inflorescentia gracillima, ampla, capitula minima 5—6 flora; bracteae florales 5 lineares; flores lutei; akenia fusiformia, valide striata, brunnea, compressa; pappus sordide albus, pedicello brunneo 1 mm longo.

Kouy-Tchéou: Kai-Tchéou, juin 1908 (Jul. Cavalerie, 3707).

427. *Lactuca Kouyangensis* Lévl., nov. spec.

Caulis 1—1,50 m altus, inconspicue striatus; folia caulinarum runcinata lobis et dentibus acuminatis, lata, ciliata triangulariter acuminata, amplexicaulia, acute auriculata; inflorescentia late et longe ramoso-paniculata; capitula pluriflora; bracteae florales lineares, acutae, margine hyalinae dein omnino refractae; akenia compressa, nigra faciebus tricostatis; pappus sordide albus longe pedicellatus; pedicello 5 mm longo.

Kouy-Tchéou: Kouy-Yang, assez rare, 20 oct. 1907 (Jul. Cavalerie, 3706).

428. *Sideritis ciliata* Thunb. var. *Mokpoensis* Vant., nov. var.

Differt a typo foliis et bracteis linearibus elongatis et non ovalibus. Folia 2—3 cm × 2—3 mm, punctuata sed non pellucide.

Corea: In herbis Mokpo, 25 sept. 1900 (Urb. Faurie, 805).

429. *Teucrium nepetoides* Lévl., nov. spec.

Caulis et folia *Melissae officinalis*; folia ovata, petiolata grosse dentata, subtus pallida; inflorescentia *Nepetae catariae*; bracteae puberulae acuminatae; calycis puberuli dentes obtusi; corolla roseo-rubra, odorata, lobo labii inferioris terminali lanceolato, staminibus longiore; stylo hamato, emarginato.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, 14 oct. 1902; mixtum cum duabus speciebus *Calaminthae* (Jul. Cavalerie).

430. *Calamintha Esquirollii* Lévl., nov. spec.

Caulis tomentellus, erectus, ramosus; folia dessiccatione caduca, petiolata suborbicularia, grosse crenata, puberula; inflorescentia nuda tomentella; verticilli numerosi, multiflori, racemosi; calyx curvatus, dentibus aequilongis, dente supremo latiore, acutis; corolla pulcherrima atro-vio-