

**Cicerbita** Wallr. [Sched. crit. (1822) 433 pp.] emend. Beauverd [in Bull. Soc. Bot. Genève, ser. II, 2 (1910)].

259) *C. songarica* (Rgl.) H. Krasch. comb. n.—*Lactuca songarica* Rgl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. XL (1867) II, p. 174.—In rupibus calcareis angustiarum Kuhitangi supra pagum Kuhitang; zona silvatica, 12 VI, n° 217.—(7).

**Mulgedium** Cass. [in Dict. sc. nat. XXXIII (1824) 296; XLVIII (1827) 426; LX (1830) 568].

260) *M. tataricum* (L.) DC. Prodr. VII (1838) 248.—*Sonchus tataricus* L. Mant. alt. (1771) 572.—Ad ripas fossae irriguae in pago Kuhitang, 16 VI, n° 267.—(6).

**Lactuca** Tourn. ex L. [Syst. ed. 1 (1735); Gen. pl. ed. 1 (1737) 240; Sp. pl. ed. 1 (1753) 795].

261) *L. saligna* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 796.—Inter *Gossypii* segetes in valle fl. Kuhitang-Darja prope pagum Kuhitang, 8 VII, n° 696.—(6).

262) *L. scariola* L. Sp. pl. ed. 2 (1763) 1119.—Inter *Gossypii* segetes in valle fl. Kuhitang-Darja prope pagum Markuschi, 22 VII, n° 948.—(6).

263) *L. spinidens* Nevski sp. n. Biennis, caule elato albido inferne spinis horizontaliter patentibus rectis ad 5 mm lg. donato, late sulcato, follis oblongo-ovatis subintegris margine inaequaliter dentatis et cartilagineo ciliato-denticulatis glaucis supra glabris subtus nervo carinali spinifero basi sagittatis amplexicaulibus, superioribus sensim decrescentibus integris adpressis, capitulis cylindræis paucifloris, involucre 8—12 mm lg. phyllis minutissime denseque papilliferis externis 2—2.5 mm lg. lanceolato-triangularibus internis lanceolato-linearibus vel linearibus externis 3—3½-plo longioribus margine undulatis acutiusculis, flosculis citrinis, acheniis ad 4 mm lg. 1.5 mm lt. fusciscentibus oblongo-ovatis compressis anguste marginatis utrinque 7—9-costatis superne margine et in costis ciliato-scabridulis, rostro acheniis 1½-plo longiore basi leviter incrassato setulosoque, pappi pilis ad 5 mm lg. Similem possideo e districtu Kuschkensi (a cl. I. Linczevski communicata) sed caulibus aculeatissimis spinis numerosissimis dense vestitis.—*A. L. scariola* L. differt foliorum forma et involucri phyllis internis margine undulatis.—Inter *Triticæ aestivi* segetes in parte inferiore decliviorum boreali-occidentalium Kuhitangi supra pagum Kuhitang, 3 VII, n° 575.—(6).

264) *L. undulata* Ldb. Fl. Alt. IV (1833) 156.—Ad declivia argillosa siccissima collium prope pagum Lalemkan, 24 VI, n° 403.—(6).

**Phænopus** (Cass.) DC. [Prodr. VII (1838) 176.—*Phoenixopus* Cass. in Dict. sc. nat. XXXIX (1826) 391].

265) *Ph. orientalis* Boiss. Voy. Esp. (1839—45) II, p. 390 in nota.—*Lactuca orientalis* Boiss. Fl. or. III (1875) 819.—In pratis stepposis cum dumis pulvinatis et *Eremuro Kaufmannii* in regione subalpina montium Kuhitang supra pagum Chodsha-i-fil, 18 VII, n° 877.—(6).

**Barkhausia** Moench. [Meth. (1794) 537].

266) *B. Bureniana* (Boiss.) H. Krasch. comb. n.—*Crepis Bureniana* Boiss. Fl. or. III (1875) 852.—*B. glanduligera* C. Winkl. in A. H. P. XI (1890) 325.—In glareosis in angustiis montium Kuhitang, 7 VI, n° 156.—(6).