

*tuca foliis hastato-lanceolatis dentatis dorso muticis amplexicaulibus, caule supernè paniculato. N.*

*Laëuca folio oblongo acuto. Bauh. Pin. 123. & Prodr. 60. Tournef. 473. Moris. Hist. 3. p. 57. Sec. 7. t. 2. f. 7. Laëuca longo & valde angusto folio. J. B. 2. p. 999. Laëuca augustana. Allion. Fl. Ped. n°. 823. Tab. 52. f. 1.*

Il semble que cette Laitue ait des rapports très-prochains avec la Laitue vireuse n°. 4, à cause de ses feuilles non découpées; mais ses feuilles n'ont point leur côte épineuse, & M. Allioni, qui nous fait connoître cette espèce, nous apprend qu'elle n'a point une odeur vireuse comme celle dont il vient d'être question.

Sa tige s'élève à peu près à la hauteur d'un homme: elle est droite, lisse, très-légèrement striée, feuillée, rameuse & paniculée dans sa partie supérieure. Ses feuilles sont amplexicaules, lancéolées, glabres, d'un vert obscur, bordées de dents terminées en spinule, à côte postérieure mutique, & à oreillettes pointues, qui les font paroître hastées ou sagittées; les supérieures sont insensiblement plus petites & moins dentées que les autres. Les fleurs sont jaunes, paniculées, portées sur des pédoncules courts. Les semences sont d'un blanc sale. Cette plante croît dans la vallée d'Aouste en Piémont, dans les lieux sablonneux situés le long du torrent qui descend de la montagne du grand St. Bernard. ☉.

7. LAITUE nudicaule, *Laëuca intybacea. H. R. Laëuca foliis runcinatis dentatis-ciliatis apice latioribus, caule subnudo laxè ramoso. N.*

*Laëuca (intybacea) foliis runcinatis dentato-ciliatis obtusis amplexicaulibus, caule paniculato. Jacq. Collect. Vol. 1. p. 53. & Ic. Rar. Vol. 1. n°. 162.*

Elle a un peu le port de l'*Hypochæris radicata* (voyez PORCELLE), à cause de sa tige & sur-tout de ses rameaux nus. Sa racine est annuelle, petite, fusiforme, fibreuse: elle pousse des feuilles roncénées, élargies & presque obtuses à leur sommet, bordées de petites dents spinuliformes, vertes & glabres des deux côtés, & étalées en rond ou en rosette sur la terre, ce que la figure citée de M. Jacquin n'exprime pas comme il le conviendrait. Du milieu de cette rosette de feuilles s'élève à la hauteur d'un pied & demi, une tige nue ou presque nue, glabre, divisée en rameaux lâches, nus, fort grêles, effilés, florifères, droits ou montans. Les fleurs sont jaunes, petites, droites, disposées le long des rameaux sur des pédoncules courts. Les semences sont pointues, couronnées d'une aigrette blanche, simple, presque sessile, plus longue que les semences mêmes. Cette plante est cultivée depuis assez long-temps au Jardin du Roi: on la dit originaire de l'Amérique méridionale. ☉. (v. v.)

8. LAITUE épineuse, *Laëuca spinosa. Laëuca*

*foliis lanceolatis sinuato-dentatis radicalibus caule ramosissimo nudo frutescente, ramis spinosis centibus. N.*

*Laëuca Hispanica maritima fruticosa spinosa. Tournef. 474. Sonchus fruticosus petraeus Africanus spinosus. Park. Theatr. 804. Raj. Hist. 224. n°. 10.*

Espèce petite, bien distincte & fort remarquable par son port, qui approche de celui de la Chicorée épineuse n°. 3. Sa tige, quelquefois à peine haute de deux ou trois pouces, d'autres fois s'élevant jusqu'à six ou sept pouces de hauteur, est fruticuleuse, très-rameuse, paniculée, nue, verdâtre, glabre, roide, à rameaux pointus & spinescens. Ses feuilles sont radicales, oblongues ou lancéolées, rétrécies vers leur base, un peu sinuées, dentées, & quelquefois légèrement découpées en lyre; ces feuilles sont glabres des deux côtés, petites, peu nombreuses, & étalées en rond sur la terre. Les fleurs sont jaunes, terminent les rameaux, ont un calice cylindrique, glabre, embriqué d'écaillés membraneuses sur les bords, dont les extérieures sont beaucoup plus courtes que les autres. Cette espèce croît en Espagne & sur la côte de Barbarie, dans les lieux maritimes & pierreux; elle est cultivée au Jardin du Roi, de graines rapportées par M. Desfontaines, à son retour de la Barbarie. ☉. (v. v.)

9. LAITUE de Canada, *Laëuca Canadensis. L. Laëuca foliis lanceolato-ensiformibus amplexicaulibus dentatis inermibus. Lin.*

*Laëuca Canadensis altissima angustifolia, flore pallide luteo. Tournef. 474. Sonchus (potius laëuca) sylvestris, folio laciniato glauco, costa non spinosa. Raj. Suppl. 137.*

Sa tige s'élève plus que celle de la Laitue cultivée; ses feuilles sont plus étroites & quatre fois plus longues: elles sont lancéolées-ensiformes, amplexicaules, dentées, non épineuses. Les fleurs viennent sur une grappe terminale, composée, alongée, & non en corymbe. L'aigrette des semences est sessile, comme dans le Laitron. Cette plante croît dans le Canada.

10. LAITUE des Indes, *Laëuca Indica. Lin. Laëuca foliis laciniato-ensiformibus sessilibus inæqualiter dentatis. Lin. Mant. 278.*

Elle ressemble à bien des égards à la Laitue de Canada: elle y convient sur-tout par sa stature élevée, effilée, étroite, & par le pédicule très-court de l'aigrette de ses semences. Cependant les feuilles de celle dont il s'agit ici sont plus dentées, ont des dents plus inégales; en outre elles sont très-peu amplexicaules, sessiles, à peine pétiolées. La panicule est plus rameuse & plus garnie de fleurs. Cette plante croît dans l'île de Java.