

232. *Senecio Evansi*, *N. E. Brown* [Compositæ]; arbustula, caule erecto apice ramoso, ramis adscendentibus paniculatim ramulosis pubescentibus, foliis alternis lanceolatis pinnatisectis petiolatis, petiolo basi late alato amplexicauli-decurrente, lobis lateralibus anguste oblongis acutis patentibus integris terminali anguste lanceolato acuto integro vel basi plus minusve dentato vel lobulato utrinque subscabro marginibus scabris, foliis ramulorum linear-lanceolatis amplexicaulibus acutis integris subscabris, pedunculis laxe 2-4 cephalis inferioribus axillaribus solitariis vel fasciculatis gracilibus folia subæquantibus vel brevioribus subscabrido-pubescentibus 2-3 bracteatis, bracteis linearibus vel linear-lanceolatis, capitulis cymosis pedicellatis discoideis-25-30-floribus luteis, involuci bracteis subbiseriatis quam flores brevioribus oblongis vel elliptico-oblongis obtusis exterioribus angustioribus minute ciliatis subglabris vel dorso pilis paucis minutis, corolla tubulosa quinqueloba glabra, pappi setis scabris, achæniis saltem junioribus pubescentibus.

*Habitat*.—Natal : on the Drakensberg, 6000-7000 feet, January, *Evans*, 366.

*Caulis* 10-12 ped. alti, 1½ poll. crassi. *Rami* 1½-2 ped. longi, ramuli 4-10 poll. longi. *Folia pinnatisecta* cum petiolis 1¾-4 poll. longa, 4-12 lin. lata, lobi laterales 1½-6 lin. longi, 1-2 lin. lati, lobo terminali 6-21 lin. longo, 1-4 lin. lati; folia integra 9-21 lin. longa, 1½-2 lin. lata. *Pedunculi* axillares 1-2½ poll. longi. *Pedicelli* 6 lin. 2 poll. longi. *Capitula* 4 lin. diam. *Involuci bracteæ* ½-2 lin. longæ, exteriores ½-¾ lin. latæ, interiores 1-1½ lin. latæ. *Corolla* 2 lin. longa.

233. *Euryops pedunculatus*, *N. E. Brown* [Compositæ]; frutex caule robusto apice ramoso, ramis simplicibus vel verticillatim triramus glabris apice sparse lanatis, foliis alternis plerumque trilobis lobis alternis linearibus subcarnosis acutis interdum bilobis vel integris linearibus glabris, pedunculis quam folia 3-4-plo longioribus terminalibus glabris, capitulis radiatis multifloris, involuci bracteis 10-12 ovatis vel ovato-oblongis acutis glabris, receptaculo denticulato, floribus radii apice minute tridentatis luteis, floribus disci campanulato-tubulosis basi angustatis, ovariis breviter albo-lanatis, pappi setis brevibus deciduis.

*Habitat*.—Natal : Olivers Hoek Pass, 4500 feet, January, *Wood*, 3601; top of Alatikulu Hill, 6000-7000 feet. January, *Evans*, 397. Orange Free State : without locality, *Cooper*, 2522. Transvaal : Houtbosh, *Rehmann*, 6133.

*Caulis* 2-3 ped. altus. *Rami* 8-12 poll. longi. *Folia* 1½-3 poll. longa, lobi ¾-1½ poll. longi, ¾-1 lin. lati. *Pedunculi* 6-10½ poll. longi. *Capitula* 9-10 lin. diam. *Involuci squamæ* 3-3½ lin. longæ, 1-1½ lin. latæ. *Corollæ radii* 5 lin. longæ, 1 lin. latæ, disci 1½-2 lin. longæ.

234. *Lactuca (Scariola) stenocephala*, *Baker* [Compositæ]; perennis, caulinis caespitosis erectis ramosis, foliis radicalibus evanescentibus caulinis reductis linearibus, capitulis 5-floris in paniculam laxam corymbosam dispositis, pedunculis strictis elongatis, involucro cylindrico glabro, bracteis biseriatis exterioribus parvis ovatis interioribus 5 linearibus obtusis æqualibus viridibus, achænio cylindrico haud rostrato, pappo albo copioso achænio duplo longiore.

*Habitat*.—Interior of Western Lagos, *Dr. Rowland*.

*Caulis* 6-9 poll. longus. *Involucrum* 8-9 lin. longum. *Achænia* 3 lin. longa. *Pappus* 6 lin. longus.