

Ex speciminibus typicis nullum prorsus inter *L. altissimam* et *sagittatam* discriben.

**Ar. Geogr.** Delphinatus, Italia borealis, Moravia, Carnia, regio Danubialis, Rossia australis.

**7. *L. stricta*** (W.K. Pl. rar. Hung. I, p. 47, tab. 48) glabra, radice ſeapiformi, caule elato simplici folioso densiuscule paniculato-corymboso, foliis primordialibus (anni primi) petiolatis obovatis integris et runcinato-lyratis, caulinis (anni secundi) lyratis et runcinato-pinnatifidis laciniis patentibus oblongis rachideque irregulariter lobato-dentatis, intermediis basi acute sagittatis, supremis linearibus integris, capitulis anguste cylindricis paucifloris, involuci glabri phyllis imbricatis obtusis ab externis triangulari-oblongis ad interna linearia auctis, flosculis luteis, acheniis nigris compressis utrinque quinquestrialis basi angustioribus apice in rostrum concolor dimidio brevius attenuatis (2). *L. quercina* Spreng. Hal. 225 et forsitan Linn. — *L. quercina* var. *pinnatifida* Bisch. Cich. p. 205. — Rehb. Ic. tab. 68.

Hab. in Caucasi monte Beschtaw (M.B.), Iberia (M.B., Hoh.). Editione nondum vidi.

**β. *Armena*.** — Foliorum laciniæ elongatae angustatae lineares. — *L. Armena* Boiss. in Ky. pl. Arm.

Hab. in queretis Armeniæ Turcicæ australis prope Warto 5000' (Ky. Suppl. 6391).

Auctores plures *L. strictam* pro varietate *L. sagittatae* habent, capitula et achenia in utrâque eisdem fere similia, sed transitus quoad folia nunquam vidi.

**Ar. Geogr.** Germania orientalis, Pedemontium, regio Danubialis.

**8. *L. Wilhelmsiana*** (F. et M. in D.C. Prodr. VII, p. 134) glabra, radice tuberosâ subglobosâ, caule elato simplici laxè et stricte paniculato-corymboso, foliis primordialibus..., caulinis strictis a basi acute sagittata in lacinas utrinque 2-3 anguste et longe linear-lanceolatas vix dentatas pinnatipartitis terminali cæteris simili, foliis summis indivisis, capitulis anguste cylindricis paucifloris, involuci glabri phyllis imbricatis ab infimis lanceolatis obtusis ad intima attenuato-acuminata sensim auctis, flosculis..., acheniis nigris compressis utrinque quinquestrialis basi angustatis apice in rostrum concolor fere aequilongum attenuatis (2).

Hab. inter frutices et in glareosis fluvii Nakitschewanchaï Armeniae Rossicae (Szovl.). Vid. in herb. D.C.

Tripedalis, laciniæ foliorum 1-1½-pollicares 1½-2½ lin. latæ, capitula sublongiora eis *L. strictæ* cui affinis est et a qua præter lacinas angustas elongatas vix dentatas foliorum quantum ex specimine unico dijudicandum differt formâ radicis, phyllis internis attenuato-acuminatis et rostro longiore.

**9. *L. virosa*** (L. Sp. 1119) radice longe fusiformi, caule elato folioso saepè ramoso inferne interdum parce aculeolato-superne paten-