

längl., spitz, pfeilförm., stachelspitzig-gezähnt, fiederspalt.-schrotsägeförm., seltener ungetheilt, Rispe pyramidal; Aeste traubig. ☉. Juli, Aug. Wegeränder, Mauern, Weinberge, Hecken, truppweise durch die Thäler der Kalkregion. A. X. 1. 2. nicht über 800'. Var.:

- β) *integrifolia*. B. alle ungetheilt, zuweilen am Kiele völlig stachellos! Beim Schiesshaus. Der *L. augustana* All., welche wir von Lippizza durch die Güte des Herrn Hofr. Reichenbach besitzen, ganz ähnlich und von dieser nur durch die unteren verkehrt-eiförmigen, an d. Spitze abgerundeten B. verschieden, welche bei *L. augustana* längl.-lanzettl., zugespitzt und am Kiele immer stachellos sind.

Anm. Die hiesigen Kräuterweiber sammeln die *Lactuca Scariola* in Menge und zwar, wie dieselben uns mittheilten, als „Gifflattich“ für die Kräuterhändler im Gleisethale, welche demnach die B. unter d. *Lactuca virosa* mischen. Dies als Notiz für Apotheker, Droguisten und Pharmakognosten! —

661. *L. saligna* L. B. am Kiel stachelig od. glatt, lineal, zugespitzt, die untersten schrotsägeförm.-fiederspalt.; Aeste ruthenförm., traubig-ählig. ☉. Juli, Aug. Wegeränder. Zwischen Winzerla und Göschwitz links an d. Strasse mit *Melilotus alba*; nach Zenk. in Rchb. „flor. sax.“ auch bei Weimar und Eisenberg. B. IV. 1. Kieseldeuter!

662. *L. muralis* Presen. B. gestielt, leyerförm.-fiederspalt., Zipfel eiförm., winkelig-gezähnt; Köpfl. rispig. ☉. Juli, Aug. Bergwälder, bes. Schläge, Abhänge, Hecken. Zerstreut und einzeln. Auf d. Jenzig und hinter d. Kunitzburg, am Kunitzberg, am Wege nach Golmsdorf u. s. w. IX. 1.—3. *Prenanthes muralis* L.

663. *L. stricta* Waldst. und Kit. B. glatt, untere schrotsäge-leyerförm., gezähnt, obere schrotsägeförm.-fiederspalt., mit pfeilförm. Basis; Rispe ebensträussig. ☉. Laubhölzer, auf Kalk. Mit Sicherheit nur am östl. Rande des Schickenholzes bei Magdala, 1844 entdeckt; nach Zenk. unter d. Kunitzburg am Südabhänge d. Gleissberges, wo sie indessen Niemand wiedergefunden. A. IV. 2. Var.:

- β) *runcinata* nob. B. alle schrotsägeförm., d. obersten ganzrand., pfeilförm.; Rispe längl. *L. quercina* L.
 γ) *heterophylla* nob. Unterste B. eiförm.-längl., zugespitzt, ganzrandig, mittlere schrotsägeförm.-fiederspalt., oberste lineal, alle mit pfeilförm. Basis.
 δ) *integrifolia* nob. B. eiförmig mit lang vorgezogener Spitze, pfeilförmiger Basis und einzelnen