

Lactuca strigosa. — Radice breviter repente; caules 35-40 cm. alti, glabri, striati, teretes, fistulosi, longe nudi, umbella 3-8 flora terminati; folia radicalia sat numerosa, angusta (10-12 mm.) undulato-dentata, limbo 5-7 cm. in petiolum 5-7 cm. longum decurrente, plus minus post desiccationem nigrescentia; caulinaria 1-2, sessilia, angusta, integra; capitula sat magna, 10-15 mm. longa (pappo incluso); involucri bracteae elongatae, anguste hyalinae, post anthesin non reflexae; calyculi 4-5 squamae breves, latae et acuminatae; flores 12-16, in quovis capitulo; akœnia 8-10 striata, haud granulosa $\frac{1}{2}$ mm. lata, 4 mm. longa (ore excluso) in os sensim attenuata; ore 3-4 mm. longo, pappo candido 5-6 mm. longo munito.

Planta aspectu macilento et depauperato.

In monte des Diamants, 20 juin 1906; n° 1139.

Prenanthes graminifolia. — Radice elongata dura; caule simplici, tenui, striato, 0,40 cm. alto, floribus 5-6 spicatis terminato; folia graminiformia, radicalia in petiolum attenuata, 10 cm. longa; caulinaria usque ad apicem caulis decrescentia ubi in bracteas convertuntur; capitula mediocria; involucri calyculo brevi bracteis 8-10 elongatis; flores 10-12 in quovis capitulo; akœnia grisea, striata, cylindrica, ad apicem convexum recte truncata; pappus parce rufus, akœnium subæquans.

Chemulpo, 28 sept. 1901; n° 437.

Prenanthes Fauriei. — Caule unico, 110-120 cm. alto, robusto, rubescente, costato, in paniculam latissimam desinente et e tertia parte ramos multos, longos, nudos, spicatos flores gerentes emittente; folia radicalia 50-60 cm. \times 2 cm. in longum petiolum attenuata; folia caulinaria longa et angusta, decrescentia; capitula numerosa; paniculae divariatae rami bractea angusta et brevi suffulti, 20-25 mm. longi; involucri bracteae 2-10 angustae, calyculo brevi; flores lutei 12-15 in quovis capitulo; akœnia 5 mm. longa, grisea, striata,