

В текущем 1941 г. описанное нами растение вторично расцвело, и диагноз вида вновь был проверен на живом экземпляре.

Данную форму желательно размножить вегетативным путем и ввести ее в садоводческую культуру.

II. Новый вид Лactuca из Армении

Lactuca Takhtadzhianii D. Sosn. sp. n.

§ 5. *Mulgedioideae* Boiss. **Cyanicae* Boiss. Fl. Or. III (1875) 804.

Perennis, glaberrima, rhizomate ascendente ramoso. Caules e rhizomatis ramis enascentes numerosi 13—36 cm alti, superne rarius a medio thyrsoido-ramosi, ramis divaricatis. Folia saepius omnia rosularia (rarius ad caulis basin folia nonnulla adsunt), sessilia glaucescentia, carnosula, subcoriacea integra obovata v. oblongo-obovata 5,5—12,0 cm longa maxima latitudine laminae in tertiam partem superiorem sita 3,0—4 cm, acuta, acuminata, margine remote et inaequaliter acute acuminato-dentata dentibus rectis v. subrecurvis nervis subtus valde prominentibus; folia caulina si adsunt pauca sensim decrescentia sublanceolata, floralia valde diminuta acuminato-protracta acuta basi subcordato-auriculata caulem amlectentia, floralia subulata v. squamiformia minutissima. Capitula numerosa florifera obconico-cylindrica parva 0,9—1,0 cm longa, 3—4 mm lata fructifera aperta hemisphaerico obconica, involucrium polyphyllum phyllis imbricatis ab externis breviter linearibus ad intima lanceolato-linearibus statim aucta, omnia obtusiuscula; flores cyanei. Achaenia compressa oblongo-obovata nigra apice rostro brevissima viridi apice in discum depresso-cylindricum dilatatum transeuntem instructa, omnia longitudinaliter elevato-striata minutissime tuberculata 3 mm longa, pappo albo achenium subaequante seti barbellatis.

Armenia. Daralagöz. Inter p.p. Khachik et Akhura, in declivibus argillosis siccis in consortio *Serratulae coriaceae*. 6.VIII.40. Leg. A. Takhtadzhian.

Specimina authentica in Herbario Instituti Botanici Filiationis Armenicae Academiae Scientiarum URSS conservantur.

Species distinctissima ab omnibus g. *Lactucae* speciebus caucasicis adhuc cognitae eximie diversa.

Голое многолетнее растение с восходящим ветвистым корневищем. Стебли, возникающие из разветвлений корневища, многочисленные, 13—36 см выс. (в среднем 18,1 см) в верхней части, реже от середины, щитковидно ветвистые с расходящимися ветвями. Листья его большей частью прикорневые (реже при основании стебля помещается несколько стеблевых листьев), сидячие, сизоватые, слегка мясистые, чуть кожистые, простые обратно-яйцевидные или продолговато-обратно-яйцевидные, к основанию

постепенно суженные с наибольшей шириной в верхней трети, длиной 5,5—12,0 (в среднем 7,5) см, наибольшая ширина 3,0—4 (в среднем 3,6) см, острые, остроконечные, по краю неравномерно отдаленно остроконечно-зубчатые с прямыми или слегка загнутыми зубцами, нервы с нижней стороны листа резко выступающие; стеблевые листья (если они имеются) немногочисленные, постепенно уменьшающиеся, почти ланцетные, верхние весьма уменьшенные, остроконечно вытянутые, острые, при основании сердцевидные со стеблеохватывающими ушками, при соцветиях шиловидные или чешуйчатые, очень мелкие. Цветки голубые; корзинки многочисленные, во время цветения обратно-конические цилиндрические, во время плодоношения открытые; полушаровидно-обратно-конические; обертка многолистная с черепичатыми листочками, от наружных коротко-линейных до внутренних ланцетно-линейных сразу увеличивающимися, все туповатые. Семянки сплюснутые, продолговато-обратно-яйцевидные, на верхушке оттянутые в очень короткий зеленый носик, расширяющийся в приплюснутый диск, все с продольными возвышающимися полосками, очень мелко бугорчатые (смотреть под биноклем), 3 мм дл., летучка белая, почти равная семянке с чуть бороздчатыми щетинками.

Армянская ССР. Даралагез. Между сс. Хачик и Ахура, на сухих глинистых склонах в зарослях *Serratula coriacea*. 6.VIII.40. Собр. А. Тахтаджян.

Очень своеобразный вид, хорошо отличающийся от всех до сих пор известных кавказских видов р. *Lactuca*.

Аутентичный экземпляр хранится в гербарии Отдела систематики Ботанического Института Армянского Филиала АН СССР в г. Ереване.

Описываемый здесь вид впервые был собран А. Л. Тахтаджяном с того же местонахождения еще в 1938 году, но всего лишь в одном единственном экземпляре, к тому же лишенном зрелых плодов; поэтому, он был отнесен нами к р. *Lactuca* лишь провизорно. В 1940 г. А. Л. Тахтаджян собрал весьма обширный материал, по которому и составлено настоящее описание.

Благодаря весьма короткому носику семян, данный вид приходится относить к секции *Mulgedioideae* Boiss. в группу с голубыми цветками. В этой группе, однако, наш вид занимает совершенно обособленное положение, и мы затруднялись сравнить *L. Takhtadzhiani* с каким-либо известным видом группы *Mulgedioideae*.

Весьма характерным является весь облик нашего растения с его плотными толстоватыми сизоватыми листьями, как бы свидетельствующий об галофитном образе жизни данного вида.

Академия Наук Грузинской ССР
Тбилисский Ботанический Институт

(Поступило в редакцию 2.8.1941)



Рис. 1. *Lactuca Takhtadzhiani* D. Sosn. Облик всего растения. 1—отцветшая корзинка; 2—отдельный цветок; 3—зрелая семянка; 4—стеблевой лист. (Рис. П. Г. Ратишвили).